

护理专业职业技能考核题库

技术一：心肺复苏术

考试时间：5 分钟

准备时间：3 分钟

考核用物：成人模拟人、纱布 2 块、手电筒

心肺复苏术操作流程及评分标准

项目	操作流程	评分细则	分值	扣分
准备	护士素质	仪表端庄；服装整洁（衣鞋帽）；语言规范，态度和蔼。	3	
	用物准备	纱布 2 块、手电筒	2	
操作过程	判断环境	确认现场安全。	2	
	识别心搏骤停	1. 判断意识：双手轻拍患者，并在患者耳边大声呼唤。	2	
		2. 判断呼吸：观察有无胸腹部起伏。	2	
		3. 同时判断大动脉搏动：考生示指、中指指端先触及气管正中，然后滑向颈外侧气管与肌群之间的沟内，触摸有无搏动。（判断时间不少于 5s，不多于 10s）	3	
	启动应急反应系统	1. 呼叫旁人帮忙。 2. 记录抢救时间。	2	
	摆放体位	1. 仰卧于硬板床或地上。 2. 去除身下异物，暴露胸部，松解腰带。	5	
	胸外心脏按压术	按压部位及手法：胸部中央（胸骨下半部分，可以两乳头中点为按压点），定位手掌根部接触患者胸部皮肤，另一手搭在定位手手背上，双手重叠，十指交叉相扣，定位手的 5 个手指翘起。	6	
		按压方法：双肘关节伸直，依靠操作者的体重、肘及臂力有节律地垂直施加压力；每次按压后迅速放松，放松时手掌根部不离开胸膛，注意胸廓充分回弹。	5	

		按压深度：成人 5-6cm	2	
		按压频率：100-120 次/分	2	
		按压时观察患者面色，同时大声正确计数	2	
	清理口腔	颈部无损伤患者，将患者头部偏向一侧，用纱布缠绕示指勾挖口腔内异物和活动性义齿，清理后将患者头部复位。（体现人文关怀）	4	
	开放气道	采用仰头提颏法开放气道	2	
		一手小鱼际置于患者前额，用力向枕后压使其头部后仰，另一手示指、中指置于患者的下颌骨下方，将颏部向前上抬起，幅度为患者耳垂与下颌角连线与地面垂直。	4	
	人工呼吸	在患者口部覆盖纱布或呼吸膜，抢救者用保持患者头后仰的拇指和示指捏住患者鼻孔。	2	
		用固定下颌的拇指按压患者下颌，使患者的口张开。	2	
		双唇包住患者口部，缓慢持续 1 秒向患者口内吹气，吹起时抢救者目光看向患者胸部，吹气量 500-600ml。	3	
		吹气毕，松开捏鼻孔的手，抢救者头稍抬起，侧转换气，同时注意观察胸部复原情况，胸廓回落进行下一次吹气，连续吹气两次。	5	
	复苏效果判断(5 组复苏后进行)	判断意识是否恢复。	2	
		判断颈动脉搏动是否恢复。	2	
		判断呼吸是否恢复。	2	
		检查瞳孔、颜面、口唇、肢端，并整理衣物，与患者沟通（体现人文关怀）。	4	
	胸外按压 (每组 30 次)	第一组（时间： ）	按压时间 15-18 秒/30 次 相当于 100-120 次/分 每组得 3 分，否则 0 分	
		第二组（时间： ）		
		第三组（时间： ）		
		第四组（时间： ）		

		第五组（时间： ）			
	人工呼吸	第一组（有效次数： ）	每有效 1 次 1 分 （以胸廓有起伏为标准） 注：第一次未回落吹第 2 次记 2 次无效	10	
		第二组（有效次数： ）			
		第三组（有效次数： ）			
		第四组（有效次数： ）			
		第五组（有效次数： ）			
全程时间要求		150-240 秒，5 分，记录实际时间。		5	
		小于 150 秒 3 分，记录实际时间。			
		大于 240-300 秒 2 分，记录实际时间。			
		超过 300 秒不得分，记录实际时间。			
扣分项		共进行 5 个循环，每缺少 1 循环扣 2 分，每多余 1 个循环扣 2 分。每个循环只有按压或人工呼吸者扣 2 分。			
		人文关怀不到位，每项扣 5 分。			
		施救过程中，心脏按压中断 10 秒以上者扣 5 分。			
共计				100	
得分					

技术二：静脉输液技术

考试时间：10 分钟

准备时间：5 分钟

考核用物：治疗盘、碘伏、无菌棉签、弯盘、处置卡片、输入液体及药物、一次性输液器、治疗巾、止血带、胶布或输液贴、输液架、医用垃圾桶、生活废物桶、锐器盒、手消毒液、剪刀、笔（必要时备绷带、夹板、棉垫）。

静脉输液技术操作流程及评分标准

项目		评分细则	分值	扣分
目的		1. 补充水分和电解质，预防和纠正水、电解质及酸碱平衡紊乱。	3	
		2. 补充血容量，改善微循环，维持血压。	3	
		3. 补充营养，促进组织修复。	2	
		4. 输入药物，控制感染，利尿消肿。	2	
实施要点	评估	1. 病情、年龄、意识、心肺功能。	1	
		2. 患者的自理能力、合作程度。	1	
		3. 药物性质、过敏史。	1	
		4. 穿刺点皮肤情况、血管情况。	2	
	操作前准备	物品准备： 治疗盘、碘伏、无菌棉签、弯盘、处置卡片、输入液体及药物、一次性输液器、治疗巾、止血带、胶布或输液贴、输液架、医用垃圾桶、生活废物桶、锐器盒、手消毒液、剪刀、笔（必要时备绷带、夹板、棉垫）。 注：少备一项扣 1 分，物品定位不合理扣 1 分	5	
		一、操作前： 1. 携用物至床旁核对患者姓名、床头卡、腕带。 核对医嘱、处置卡片、药物。	5	

	操作流程	2. 自我介绍, 说明静脉输液的目的及药物作用, 协助病人大小便, 取舒适体位。	5	
		3. 打开治疗车下层各个桶盖。	2	
		4. 按六步洗手法洗手, 戴口罩。	2	
		5. 操作前查对。	5	
		二、操作中		
		1. 将输液瓶挂在输液架上, 排尽空气, 头皮针留在输液袋内置于处置车上。	3	
		2. 铺治疗巾, 扎止血带, 选择血管。	2	
		3. 松止血带。	2	
		4. 以穿刺点为中心, 安尔碘消毒皮肤, 消毒范围为 8cm×10cm。	3	
		5. 扎止血带, 碘伏再次消毒皮肤。	3	
		6. 准备输液贴。	1	
		7. 取下护针帽, 再次排气 (不浪费药液)。	3	
		8. 操作中查对。	3	
		9. 嘱病人握拳, 穿刺, 见回血将针头再沿静脉进针少许。	4	
		10. 松止血带, 嘱病人松拳, 打开调节器。	3	
		11. 胶布固定美观、妥当 (小儿和躁动病人可用夹板)。	2	
		12. 根据病人情况及药物性质调节输液速度。	2	
		13. 撤治疗巾、止血带。	2	
		三、操作后		
		1. 操作后查对。	2	
		2. 整理床单位, 协助病人取舒适体位, 放置呼叫器于病人可取处。	2	

		3. 告知病人输液中的注意事项，有变化及时告知医护人员。	2	
		4. 处理用物，洗手，摘口罩、记录。	2	
评价		1. 操作熟练、节力，遵守无菌原则。	3	
		2. 关爱病人，床单位整洁，病人舒适。	3	
		3. 操作步骤有序符合要求。	4	
		4. 仪表符合要求。	4	
注意事项		1. 选择粗直、弹性好、易于固定的静脉，避开关节和静脉瓣，下肢静脉不应作为成年人穿刺血管的常规部位。	1	
		2. 在满足治疗前提下选用最小型号、最短的针头。	2	
		3. 输注 2 种以上药液时，注意药物间的配伍禁忌。	1	
		4. 不应在输液侧肢体上端使用血压袖带和止血带。	1	
		5. 定期换药，如果患者出汗多，或局部有出血或渗血，可选用纱布敷料。	1	
共计			100	
得分				

技术三：皮内注射技术

考试时间：8 分钟

准备时间：5 分钟

考核用物：治疗车、无菌盘、无菌持物钳、75%乙醇（酒精过敏者备灭菌注射用水）、无菌棉签、无菌纱布或棉球、砂轮、弯盘、启瓶器、1ml 注射器、皮试急救盒（0.1%盐酸肾上腺素注射液、地塞米松磷酸钠 5mg、盐酸异丙嗪 25mg、1ml 注射器、5ml 注射器）、生理盐水、注射执行单、红笔、蓝黑笔、手消毒液、锐器桶、医疗垃圾桶、生活垃圾桶。

皮内注射技术操作流程及评分标准（以药物过敏试验为例）

项目		评分细则	分值	扣分
操作前准备	护士准备	1. 服装、鞋帽整洁、着装符合要求。	3	
		2. 仪表端庄、举止大方、语言文明规范、态度和蔼。	3	
		3. 修剪指甲、洗手、戴口罩。	3	
	环境准备	清洁、安静、光线适宜。	4	
	评估患者并解释	1. 核对患者手腕带及床头卡。	2	
		2. 评估患者病情、治疗情况、用药史、过敏史、家族史。	5	
		3. 评估患者意识状态、心理状态、合作程度及对用药的认知。	4	
		4. 评估注射部位的皮肤状况。	3	
		5. 询问患者是否有饥饿、头晕、心肌、气短等不适。	3	
		6. 向患者解释皮内注射目的、方法、注意事项、配合要点及副作用。	5	
	用物物品	1. 备齐用物，放置合理。	2	
		2. 遵医嘱备药物、医嘱单、另备急救药。	3	
操作步骤	操作	1. 核对药物，去除生理盐水及药物外盖中心部分	3	
		2. 分别消毒瓶盖，方法正确。	3	
		3. 抽吸药液准确。	3	

操作流程质量		4. 配置方法正确，配好的皮试液置无菌盘内。	3	
		5. 携用物至患者床旁，核对，协助患者取适当体位。	3	
		6. 75%酒精常规消毒皮肤、待干（方法正确，棉签无倒置、无污染）。	4	
		7. 再次核对药物，并排出注射器内空气，排气方法正确。	4	
		8. 注射：左手紧绷注射部位皮肤，右手持注射器，针头斜面向上与皮肤呈 5° 角刺入皮内，待针尖斜面完全进入皮内后，放平注射器，左手拇指固定针栓，注入药液 0.1ml，使局部隆起形成一半球状皮丘，皮肤变白并显露毛孔。	10	
		9. 注射完毕，迅速拔出针头，勿按压针眼。	2	
		10. 再次核对、记录。	2	
		11. 整理床单位，正确处理用物，洗手。	3	
终末质量	观察指导	1. 交待用药后注意事项。	5	
		2. 两名护士在规定时间内判断结果并记录。	5	
	操作评价	1. 操作全过程无菌观念强，严格查对，动作稳重、轻巧、操作熟练，流程准确。	5	
		2. 注射角度适当，药液剂量准确。	5	
	时间	操作时间 < 7min 每超 30s 扣 0.5 分计时从核对药物始至洗手止		
共计			100	
得分				

护理专业综合课考试题库

基础护理试题部分

一、单选题

1. 南丁格尔创建世界第一所护士学校的时间是(C)
A. 1840 年 B. 1854 年 C. 1860 年 D. 1888 年 E. 1890 年
2. 现代护理诞生于(C)
A. 17 世纪 B. 18 世纪 C. 19 世纪 D. 20 世纪 E. 22 世纪
3. 世界卫生组织决定提出“2000 年人人享有卫生保健”的时间是(A)
A. 1977 年 B. 1978 年 C. 1981 年 D. 1994 年 E. 1995 年
4. 对患者实施 8 小时在岗、24 小时负责制的护理工作方式属于(D)
A. 个案护理 B. 功能制护理 C. 小组制护理 D. 责任制护理 E. 综合护理
5. 我国的第一所护士学校位于(D)
A. 南京 B. 北京 C. 上海 D. 福州 E. 广东
6. 一般病室两床之间至少应相距(B)
A. 50cm B. 100cm C. 150cm D. 200cm E. 300cm
7. 为保持病室空气新鲜每天开窗通风时间为(E)
A. 4h B. 3h C. 2h D. 1h E. 30min
8. 下列哪种患者需要较高的病室空气湿度(B)
A. 心力衰竭 B. 支气管哮喘 C. 急性喉炎 D. 急性肺水肿 E. 肾炎
9. 下列属于内环境的是(C)
A. 物理环境 B. 生物环境 C. 心理状态 D. 社会交往 E. 风俗习惯
10. 根据 WHO 规定的噪声标准, 白天医院病区较理想的噪声强度是(D)
A. 10-15 dB B. 15-20dB C. 20-30dB D. 35-40dB E. 45-50dB
11. 一般病室墙面的颜色宜采用 (B)
A. 浅红色 B. 浅绿色 C. 深黄色 D. 全白色 E. 青蓝色
12. 麻醉护理盘内不需准备的物品是(C)
A. 输氧导管 B. 通气导管 C. 导尿管 D. 吸痰导管 E. 张口器
13. 铺麻醉床错误的操作是(C)

- A. 拆除原有的枕套、被套、大单等
 - B. 根据病情和手术部位将橡胶单和中单铺在床头床中部或床尾
 - C. 铺橡胶单、中单顺序为先床头再中间
 - D. 橡胶单、中单若铺在床中部，则上端距床头 45-50cm
 - E. 盖被三折于一侧床边
14. 下列分级护理正确的是(B)
- A. 特别护理适用对象为病人病情危重, 需绝对卧床休息者
 - B. 一级护理应每小时巡视患者
 - C. 特级护理不需要做基础护理
 - D. 二级护理适用于病人生活能自理者
 - E. 三级护理应每 1-2 小时巡视病人一次
15. 住院处办理入院手续的根据是(D)
- A. 单位介绍信
 - B. 转院证明
 - C. 门诊病历
 - D. 住院证
 - E. 社保证明
16. 休克病人入病室后护士首先应(B)
- A. 填写各种卡片
 - B. 通知医生配合抢救测量生命体征
 - C. 询问病史、评估发病过程
 - D. 通知营养室，准备膳食
 - E. 介绍病室病友
17. 传染病入院时换下的衣物应如何处理(C)
- A. 包好后存放
 - B. 交给家属带回
 - C. 消毒后存放或消毒后交给家属带回
 - D. 日光暴晒后存放
 - E. 消毒后交病人保管
18. 出院护理过程中错误的是(B)
- A. 办理出院手续
 - B. 停止注射给口服药继续服用
 - C. 介绍出院后有注意事项
 - D. 征求病人意见
 - E. 热情护送出院
19. 出院病人的床单位处理错误的是(C)
- A. 撤去病服送洗
 - B. 被褥暴晒 6 小时每两小时翻动一次
 - C. 床、桌用洗涤剂擦洗
 - D. 茶具、痰杯用消毒液浸泡
 - E. 准备备用床
20. 病人入院时间, 应如何填写在体温单上(C)
- A. 39-40 摄氏度之间, 相应时间格内用红笔
 - B. 40-41 摄氏度之间, 相应时间格内竖写用蓝笔
 - C. 40-42 摄氏度之间, 相应时间格内用红笔书写
 - D. 40-42 摄氏度之间, 相应时间格内用蓝笔书写
 - E. 38-42 摄氏度之间, 相应时间格内用红笔书写

21. 准备用平车送一个在急诊室已给予输液吸氧的病人进入病房护送途中护士应注意(A)

- A. 观察输液吸氧情况, 避免中断
- B. 拔管暂停输液吸氧
- C. 暂停吸氧输液继续
- D. 暂停输液吸氧继续
- E. 暂停护送, 待病情好转后再送入病房

22. 王大妈因病住院, 护士应如何为其准备床单位 (A)

- A. 根据病情需要选择床位
- B. 将其安排在危重病室以便观察
- C. 将其安排在护士办公室旁边以便观察
- D. 按其要求安排床位
- E. 将其安排在隔离病室

23. 支气管哮喘发作期病人入院时应(A)

- A. 安置在监护病室
- B. 安置在普通病房
- C. 安置在隔离病室
- D. 安置在门诊观察室
- E. 安置在处置室

24. 办理出院手续错误的是(C)

- A. 医生根据病人的病情决定出院时间
- B. 护士提前通知病人或家属做好准备
- C. 病人家属直接去住院处办理出院
- D. 办完手续后, 取回寄存物品
- E. 护士协助病人整理物品

25. 特级护理的病人正确的观察时间是(A)

- A. 应该是 24 小时专人守护
- B. 应该是 15-30 分钟观察一次
- C. 应该是 1-2 小时观察一次
- D. 应该是 2-3 小时巡视一次
- E. 应该是 4-6 小时巡视一次

26. 以下哪些病人应进行二级护理(D)

- A. 器官移植大面积烧伤
- B. 高热大出血
- C. 休克瘫痪
- D. 年老体弱幼儿
- E. 疾病恢复期选择性手术前的准备阶段

27. 以下哪些病人应进行一级护理(B)

- A. 器官移植大面积烧伤
- B. 高热大出血
- C. 严重创伤
- D. 年老体弱幼儿
- E. 疾病恢复期, 选择性手术前的准备阶段

28. 以人的健康为中心的发展阶段, 护理工作的特征是 (C)

- A. 工作方法是执行医嘱和护理常规
- B. 按护理程序对患者实施整体护理
- C. 工作范围扩展到所有人的所有生命阶段
- D. 工作场所局限于医院
- E. 工作场所局限于社区

29. 新的医学模式是(B)

- A. 生物-生理-社会医学模式 B. 生物-心理-社会医学模式
C. 生物-技术-环境医学模式 D. 生物-生理-心理医学模式
E. 生物-科技-心理医学模式

30. 患者，女，65 岁，患过敏性哮喘，经积极治疗后痊愈，但该患者仍然不肯出院，事事需要护士帮助，这种角色适应不良的情况属于（ B ）

- A. 角色行为冲突 B. 角色行为强化 C. 角色行为缺如
D. 角色行为异常 E. 角色行为消退

31. 根据马斯洛的人类基本需求理论，人类最基本最重要的需要是（ A ）

- A. 生理的需要 B. 安全的需要
C. 爱与归属的需要 D. 自尊与被尊重的需要 E. 自我实现的需要

32. 不舒适中最常见的表现是（ A ）

- A. 疼痛 B. 烦躁不安 C. 紧张无力 D. 精神不振 E. 失眠

33. 影响病人舒适最重要的因素是（ E ）

- A. 恶心 B. 饥饿 C. 咳嗽 D. 肌肉紧张 E. 疼痛

34. 牵涉痛常出现在（ B ）

- A. 截肢后仍感觉患肢疼痛 B. 心梗时的左肩疼痛 C. 缓慢、持续的疼痛
D. 定位准确的刺痛 E. 定位不明确的弥散性疼痛

35. 患者男 18 岁。尿蛋白定性检查+++，尿蛋白定量 3.5g/24h，镜下血尿，眼睑及双下肢轻度水肿，以肾炎收治。为协助检查测定肾小球滤过功能应摄入（ B ）

- A. 低盐饮食 B. 肌酐试验饮食 C. 普通饮食 D. 高热量饮食 E. 无盐低钠饮食

36. 关于要素饮食保存的要求正确的是（ D ）

- A. 常温下保存 12 小时 B. 0 摄氏度冰箱中保存 48 小时
C. 0 摄氏度冰箱中保存 1 周 D. 4 摄氏度冰箱中保存 24 小时
E. 4 摄氏度冰箱中保存 48 小时

37. 属于脂溶性维生素的是（ A ）

- A. 维生素 k B. 维生素 b1 C. 维生素 c D. 维生素 pp E. 维生素 b6

38. 患者女，40 岁，诊断为伤寒，拟住院 2 周，病情处于恢复期。应给予的饮食是（ E ）

- A. 低糖饮食 B. 高蛋白饮食 C. 要素饮食 D. 高膳食纤维饮食 E. 少渣饮食

39. 甲状腺吸收 ¹³¹I 测定前，应禁食的食物是（ D ）

- A. 瘦肉 B. 鳝鱼 C. 牛肉 D. 紫菜 E. 猪肝
40. 缺乏时会导致佝偻病的矿物是 (C)
- A. 钠 B. 钾 C. 钙 D. 碘 E. 铁
41. 全麻后去枕仰卧头偏向一侧的主要目的 (B)
- A. 预防舌后坠 B. 预防呕吐物吸入 C. 避免呼吸道梗阻
- D. 预防虚脱 E. 减少头痛
42. 取半坐卧位时床头支架角度应取 (C)
- A. 10-20 度 B. 20-30 度 C. 30-50 度 D. 45-60 度 E. 60-90 度
43. 盆腔炎病人取半坐卧位的目的是 (B)
- A. 减少炎症渗出 B. 促使感染局限化 C. 减轻疼痛
- D. 舒适 E. 减轻盆腔充血
44. 胎膜早破的孕妇应采用的卧位是 (B)
- A. 屈膝仰卧位 B. 头低足高位 C. 头高足低位 D. 侧卧位 E. 截石位
45. 采用被动体位的病人是 (D)
- A. 呼吸困难的病人 B. 心力衰竭的病人 C. 支气管哮喘的病人
- D. 昏迷病人 E. 腹膜炎病人
46. 作妇科检查病人应采取 (B)
- A. 膝胸位 B. 截石位 C. 仰卧位 D. 侧卧位 E. 俯卧位
47. 颅脑手术后病人应采取 (C)
- A. 半卧位 B. 仰卧位 C. 头高足低位 D. 侧卧位 E. 端坐位
48. 急性腹膜炎术后取半坐位的主要目的是 (D)
- A. 利于呼吸运动 B. 减轻腹部伤口缝合的张力 C. 减轻疼痛
- D. 利于腹腔引流使感染局限化 E. 有利于伤口愈合
49. 休克病人应采取的体位是 (B)
- A. 头低足高位 B. 仰卧位头和躯干抬高 20 度，下肢抬高 30 度
- C. 半卧位 D. 去枕仰卧位 E. 俯卧位
50. 平卧位适于 (A)
- A. 肝门静脉分流术后 48 小时内患者 B. 甲亢术后患者 C. 乳癌术后患者
- D. 急性阑尾炎术后患者 E. 重症急性胰腺炎患者

51. 病人外出做 B 超, 回病室后突然出现胸闷气促出汗, 诊断为心力衰竭, 应采用的卧位是(A)

A. 端坐位 B. 仰卧位 C. 侧卧位 D. 头高足低位 E. 中凹卧位

52. 某甲亢病人, 在甲状腺大部切除术后, 采用半坐卧位的目的是(A)

A. 减轻局部出血 B. 减轻心脏负担 C. 避免疼痛
D. 有利于伤口愈合 E. 有利于治疗护理

53. 使用约束带时, 不正确的做法是(A)

A. 因治疗、护理的需要, 不需向病人或家属解释 B. 使用约束带应放衬垫
C. 被约束的肢体应置于功能位置 D. 需定时松解约束带
E. 保证病人安全舒适

54. 下列哪项不属于安全保护具(C)

A. 床档 B. 支被架 C. 床网 D. 宽绷带 E. 约束带

55. 南丁格尔的贡献, 在克里米亚战争中, 士兵死亡率从 50%降到(A)

A. 2. 2% B. 20% C. 4% D. 5% E. 7%

56. 护理学的基本概念中最核心的是(B)

A. 护理 B. 人 C. 健康 D. 环境 E. 生活

57. 中华护理学会成立于(C)

A. 1860 年 B. 1888 年 C. 1909 年 D. 1920 年 E. 1960 年

58. 护理学四个基本概念中的“人”是指(D)

A. 患病的群体 B. 健康的群体 C. 患病的个体
D. 所有个体和群体, 包括健康的, 也包括患病的 E. 大自然中的个体

59. 以人的健康为中心的护理阶段的特点是(A)

A. 对人的生命全过程提供护理 B. 护理仅限于简单的生活照料
C. 护理工作以消除病灶为目标 D. 对患者进行整体护理 E. 对患者单一护理

60. 患者刘某, 退休工人, 因慢性肾炎住院。入院后要求护理人员将同病室的患者介绍与他认识, 这是属于满足其(D)

A. 生理需要 B. 安全需要 C. 尊重需要 D. 爱与归属的需要 E. 自我实现的需要

61. 身体最大的器官是(C)

A. 脑 B. 血管 C. 皮肤 D. 肌肉 E. 神经

62. 实施淋浴时下列哪项叙述不正确的是(B)
- A. 七个月以上孕妇可淋浴 B. 心力衰竭的病人可盆浴
C. 衰弱病人可床上擦浴 D. 上消化道出血活动期禁浴
E. 阑尾炎术后第七天可淋浴
63. 病人的活动性假牙取下刷洗后浸泡在(A)
- A. 清水中 B. 70%的乙醇 C. 苯扎溴铵 D. 热开水 E. 以上均不可
64. 为昏迷病人作口腔护理, 哪种物品是不可用的(D)
- A. 石蜡油 B. 压舌板 C. 弯血管钳 D. 吸水管 E. 换药碗
65. 正常人一般不易引起口腔感染, 是由于唾液中含有(A)
- A. 溶菌酶 B. 游离酸 C. 脂肪酶 D. 淀粉酶 E. 乳糖酶
66. 发生压疮的主要原因是(E)
- A. 皮肤受潮湿摩擦刺激 B. 病原微生物侵入皮肤组织 C. 年老体弱营养不良
D. 皮肤过敏反应 E. 局部组织受压过久
67. 下列哪种患者需要做特殊口腔护理(B)
- A. 支气管扩张 B. 昏迷 C. 消化不良 D. 胃炎 E. 肺脓肿
68. 0.02%呋喃西林溶液用于口腔护理的机制是(A)
- A. 广谱抗菌作用 B. 改变细菌生长的 pH 环境 C. 放出新生态氧
D. 使菌体蛋白凝固变性 E. 促进溃疡愈合
69. 为病人淋浴盆浴时, 水温不可过高, 以免产生(C)
- A. 恶心 B. 疲劳 C. 眩晕 D. 休克 E. 昏迷
70. 灭头虱的方法中, 错误的一项是(D)
- A. 反复揉搓头发 10 分钟 B. 24 小时后用篦子篦去死虱、洗发
C. 病人换下污衣裤高压蒸汽灭菌 D. 梳子和篦子先清洗后消毒
E. 用纱布沾百部酊, 按顺序擦洗头发
71. 昏迷病人需用张口器时, 应从(B)
- A. 尖牙处放入 B. 臼齿处放入 C. 门齿放入 D. 舌底 E. 以上都不对
72. 一氧化碳中毒的患者需输注的血液制品是(A)
- A. 浓缩红细胞 B. 纤维蛋白原 C. 白细胞浓缩悬液
D. 血小板浓缩悬液 E. 洗涤红细胞
73. 低分子右旋糖酐的主要作用是(A)

- A. 降低血液黏稠度, 改善微循环 B. 提高血浆胶体渗透压
C. 补充蛋白质, 改善循环 D. 补充营养和水分, 减轻水肿
E. 供给热能, 保持酸碱平衡
74. 选用 0.1% 的醋酸溶液进行漱口适用于下列哪种细菌感染(E)
- A. 肺炎双球菌 B. 霉菌 C. 革兰阳性菌
D. 大肠埃希菌 E. 铜绿假单胞菌
75. 大量输注库存血时要防止发生(E)
- A. 碱中毒和低血钾 B. 碱中毒和高血钾 C. 低血钾和低血钠
D. 酸中毒和低血钾 E. 酸中毒和高血钾
76. 1500ml 的液体从早上 8:30 开始输注, 滴数系数为 15, 调节滴数为 75 滴/分, 其输完的时间是(C)
- A. 12:30 B. 13:00 C. 13:30 D. 14:00 E. 14:30
77. 库存血在 4° C 的环境内可保存(E)
- A. 24h B. 48h C. 72h D. 1 周 E. 2-3 周
78. 在输血前后, 为防止不良反应发生, 应静脉输入的溶液是(C)
- A. 复方氯化钠溶液 B. 5%碳酸氢钠溶液 C. 0.9%氯化钠溶液
D. 1.2%乳酸钠溶液 E. 10%葡萄糖酸钙溶液
79. 用 50% 的乙醇按摩局部皮肤的目的是(E)
- A. 消毒皮肤 B. 去除污垢 C. 降低体温 D. 润滑皮肤 E. 促进血液循环
80. 压疮为四期, 按发生顺序为(E)
- A. 炎性浸润期、淤血红润期、溃疡期、水肿期
B. 淤血红润期、炎性浸润期、败血症期、溃疡期
C. 初期、中期、后期、晚期
D. 发生期、进行期、愈合期、恶化期
E. 淤血红润期、炎性浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期
81. 下列不属于输液反应的是(C)
- A. 静脉炎 B. 循环负荷过重反应 C. 溶血反应 D. 发热反应 E. 空气栓塞
82. 淤血红润期压疮护理重点是(A)
- A. 增加翻身按摩次数 B. 表面涂滑石粉 C. 紫外线照射

D. 防止感染 E. 用优碘溶液

83. 输血注意事项错误的是(B)

- A. 须两人核对无误后方可输入 B. 输血时可根据需要加入药品
C. 如用库存血必须认真检查库存血质量 D. 如发生严重反应时, 应立即停止输血
E. 根据医嘱采集血标本, 要求每次只为一位患者采集

84. 1%-4%的碳酸氢钠溶液用于口腔护理的机制是(B)

- A. 防腐防臭作用 B. 改变细菌生长的 pH 环境 C. 放出新生态氧
D. 广谱抗菌作用 E. 减轻溃疡疼痛

85. 患者男, 41 岁, 酒精中毒。查体: 呼吸不规则, 血压 98/70mmHg, 不能唤醒, 但压其眶上缘时皱眉并有躲避反应, 瞳孔对光反射迟钝, 小便失禁。医嘱密切观察病情变化, 洗胃。若患者出现瞳孔散大, 是指瞳孔直径起码应大于(B)

- A. 3.5mm B. 5mm C. 2.5mm D. 4mm E. 6mm

86. 吗啡中毒的瞳孔变化为(A)

- A. 双瞳孔缩小 B. 双瞳孔散大 C. 双瞳孔不等大 D. 瞳孔反射消失 E. 瞳孔呈乳白色

87. 脑外伤昏迷口腔护理注意(E)

- A. 取下假牙 B. 擦拭时勿触及咽喉 C. 涂龙胆紫
D. 动作轻稳勿损伤粘膜 E. 棉球不可过湿

88. 给一卧床病人洗头时, 发现病人面色脉搏呼吸有异常变化应立即(E)

- A. 增高水温 B. 给热饮料 C. 变换体位
D. 加盖毛毯 E. 以上都不对

89. 肺炎球菌性肺炎病人长期使用抗生素, 口腔黏膜分泌物为乳白色, 可能感染的细菌是(D)

- A. 葡萄球菌 B. 大肠埃希菌 C. 肺炎球菌
D. 真菌 E. 链球菌

90. 不能翻身的患者, 护理人员帮其做到(B)

- A. 每 1 小时翻身一次 B. 每 2 小时翻身一次 C. 4 小时翻身一次
D. 每 5 小时翻身一次 E. 6 分钟翻身一次

91. 意识全部丧失, 所有反射均消失的状态称为(E)

- A. 嗜睡 B. 昏睡 C. 意识模糊 D. 浅昏迷 E. 深昏迷

92. 一截肢病人长时间仰卧, 最易产生压疮的部位(A)

- A. 骶尾部 B. 足跟部 C. 枕部 D. 肩胛部 E. 肘部
93. 患者男 65 岁, 观察可见患者面肌消瘦、面色苍白、表情淡漠、双目无神、眼眶凹陷, 其面容属于(D)
- A. 急性病容 B. 希氏面容 C. 慢性病容 D. 病危面容 E. 二尖瓣面容
94. 不会影响病人入睡的因素(B)
- A. 卧位不适 B. 适当通风 C. 焦虑不安 D. 伤口疼痛 E. 强光和噪声
95. 压疮淤血红润期的主要特点是(A)
- A. 局部皮肤出现红、肿、热、痛 B. 皮下产生硬结
- C. 局部组织坏死 D. 表皮有水泡形成 E. 浅表组织有脓液流出
96. 在睡眠各时期中, 肌电图反应肌张力最低的是(E)
- A. NREM 第一期 B. NREM 第二期 C. NREM 第三期
- D. NREM 第四期 E. REM
97. 冬季睡眠的适宜温度是(A)
- A. 18-22 摄氏度 B. 22-26 摄氏度 C. 25 摄氏度左右
- D. 16-20 摄氏度 E. 20-25 摄氏度
98. 患者, 男, 35 岁。脑外伤急诊术后, 患者一直处于昏迷状态, 各种反射迟钝, 肌张力消失, 心跳减弱, 血压下降, 皮肤湿冷, 脉搏细弱, 出现毕奥呼吸。此时该患者处于(A)
- A. 濒死期 B. 临床死亡期 C. 生物学死亡期 D. 生理学死亡期 E. 脑死亡期
99. 患者, 男, 35 岁。脑外伤急诊术后, 患者一直处于昏迷状态, 各种反射迟钝, 肌张力消失, 心跳减弱, 血压下降, 皮肤湿冷, 脉搏细弱, 出现毕奥呼吸。该患者最后消失的感觉是(C)
- A. 视觉 B. 嗅觉 C. 听觉 D. 痛觉 E. 味觉
100. 患者, 女, 53 岁, 乳腺癌晚期。身体极度衰竭, 卧床不起, 情绪暴躁、常无端发脾气。此时患者的心理反应是(B)
- A. 否认期 B. 愤怒期 C. 协议期 D. 忧郁期 E. 接受期
101. 紫外线灯消毒物品时, 照射距离时间为(B)
- A. 20-25 厘米 10-20 分钟 B. 25-60 厘米 20-30 分钟
- C. 30-80 厘米 30-40 分钟 D. 35-90 厘米 20-30 分钟
- E. 25-60 厘米 30-40 分钟

102. 紫外线消毒物品, 计时应从灯亮后(B)
- A. 1-3 分钟 B. 5-7 分钟 C. 10-12 分钟 D. 15-20 分钟 E. 25-30 分钟
103. 消毒的含义(B)
- A. 消毒物品上的一切污垢 B. 清除或杀灭传播媒介上的病原微生物
- C. 消灭物品上的所有微生物 D. 杀灭物品上的芽胞 E. 以上都不正确
104. 煮沸消毒时, 在水温达 100 摄氏度左右, 再煮___可杀灭细菌繁殖体(A)
- A. 5-10 分钟 B. 15-30 分钟 C. 30-45 分钟
- D. 45-60 分钟 E. 60-120 分钟
105. 压力蒸汽灭菌方法, 下列叙述错误的是(C)
- A. 是热力灭菌中效果最可靠的方法
- B. 不能用于凡士林等油类和滑石粉等粉剂的灭菌
- C. 灭菌包体积不可超过 50×50×25 厘米
- D. 需做灭菌效果检测
- E. 灭菌锅内物品应保持适当间隔
106. 将被褥在阳光下暴晒 6 小时的目的(B)
- A. 清洁 B. 消毒 C. 灭菌 D. 灭虱 E. 隔离
107. 对被特殊感染而无保留价值的物品, 需彻底的灭菌方法(C)
- A. 煮沸消毒灭菌法 B. 高压蒸汽灭菌法 C. 燃烧法
- D. 日光暴晒法 E. 过氧乙酸浸泡法
108. 配 0. 1% 的苯扎溴铵溶液 500 毫升, 需要 5% 的苯扎溴铵多少毫升(E)
- A. 500 毫升 B. 400 毫升 C. 300 毫升 D. 200 毫升 E. 100 毫升
109. 碘酐的灭菌原理(B)
- A. 破坏细胞膜的结构 B. 与菌体蛋白的氨基结合使其变化
- C. 使菌体蛋白凝固变性 D. 干扰细菌酶的活性 E. 以上都不对
110. 杀死病毒和芽胞的最佳消毒剂为(E)
- A. 70% 的酒精 B. 0. 5% 碘酐 C. 0. 2% 苯扎溴铵
- D. 0. 2% 的洗必泰 E. 0. 5% 过氧乙酸
111. 与肥皂相遇降低消毒力的药物(E)
- A. 酒精 B. 碘酐 C. 过氧乙酸 D. 漂白粉 E. 氯己定
- 112 紫外线灯做空气消毒时, 有效的距离(A)

A. <2 米 B. <5 米 C. <3 米 D. <5 米 E. <4 米

113. 保管无菌物品哪些错误(C)

- A. 无菌物与非无菌物应分别放置 B. 无菌包必须注明灭菌日期
- C. 已打开过的无菌包, 48 小时后必须重新灭菌
- D. 取出的无菌敷料不得放回无菌容器内
- E. 无菌物品疑有污染应给予更换并重新消毒

114. 使用无菌持物钳的方法哪项是错误的(D)

- A. 取放钳时钳端必须闭合 B. 使用钳端朝下不得反转向下
- C. 不可夹取油纱布 D. 到远处夹取物品后立即放回原处
- E. 每一容器只能放一把钳子

115. 无菌盘铺好后有效期不超过(B)

- A. 2 小时 B. 4 小时 C. 8 小时 D. 12 小时 E. 16 小时

116. 高压蒸汽灭菌法、达到灭菌目的宜用(D)

- A. 压力 70kpa, 温度 116 摄氏度, 时间 10 分钟
- B. 压力 80kpa, 温度 118 摄氏度时间 15 分钟
- C. 压力 90kpa, 温度 120 摄氏度时间 20 分钟
- D. 压力 102.8-122.9kpa, 温度 121 摄氏度时间 20-30 分钟
- E. 压力 110-115 摄氏度温度, 125-130 摄氏度时间 30-60 分钟

117. 使用无菌容器正确的操作是(E)

- A. 盖的内面朝下以便放置稳妥 B. 手抓边缘以便持物牢靠
- C. 容器内无菌物取出后未污染物品可放回 D. 开盖 30 分钟内盖好以防污染
- E. 手指不可触及容器内面及边缘盖内面朝上

118. 无菌区的定义是(B)

- A. 经过灭菌处理的区域 B. 经过灭菌处理且未被污染的区域
- C. 未经灭菌处理的区域 D. 不使已灭菌的物品再被污染并保持无菌
- E. 灭菌处理后被污染的区域

119. 无菌盘的使用方法哪项错误(C)

- A. 治疗盘要干燥清洁 B. 铺无菌盘应遵守无菌操作原则
- C. 无菌巾一旦受潮应晾干再用 D. 无菌巾内面保持无菌
- E. 铺好的无菌盘应在 4 小时内使用

120. 无菌溶液时下列哪项错误(C)

- A. 必须核对标签
- B. 检查溶液有无沉淀浑浊及颜色的改变
- C. 必要时, 可将无菌棉签直接伸入瓶内蘸取
- D. 手不可触及瓶口及盖的内面
- E. 已打开过的溶液可保存 24 小时

121. 关于体温生理性变化的错误描述是(D)

- A. 昼夜中以清晨 2-6 时最低, 下午 14-18 时最高
- B. 儿童体温稍高于成人
- C. 老人体温稍低于成年人
- D. 女性月经前期和妊娠早期稍低
- E. 进食运动后体温一过性增高

122. 体温调节中枢位于(B)

- A. 丘脑上部
- B. 丘脑下部
- C. 中脑
- D. 延髓
- E. 脑桥

123. 酒精擦浴后应何时为病人测体温(D)

- A. 5 分钟
- B. 10 分钟
- C. 20 分钟
- D. 30 分钟
- E. 40 分钟

124. 鼾声呼吸多见于(D)

- A. 胸膜炎
- B. 肺炎
- C. 酮症酸中毒
- D. 昏迷
- E. 呼吸衰竭

125. 呼吸减慢是指每分钟呼吸少于(B)

- A. 10 次
- B. 12 次
- C. 14 次
- D. 16 次
- E. 20 次

126. 关于体温, 下列叙述哪项不正确(D)

- A. 正常人体温舌下 36.3-37.2 摄氏度
- B. 肛温是 36.5-37.7 摄氏度
- C. 腋温 36-37 摄氏度
- D. 测肛温时应将肛表插入肛门 4-6 厘米
- E. 妇女排卵至经前体温上升

127. 当心脏病人出现二联率时, 其脉搏表现(A)

- A. 间歇脉
- B. 奇脉
- C. 交替脉
- D. 绌脉
- E. 水冲脉

128. 错误的诊脉操作(E)

- A. 诊脉前病人保持安静
- B. 手臂伸展放在舒适体位
- C. 食指中指无名指切脉
- D. 正常脉搏测半分钟的数×2
- E. 有脉搏短绌者先听心率再测脉率计时一分钟

129. 深长而规则的呼吸常见于(B)

- A. 甲状腺亢进
- B. 代谢性酸中毒
- C. 濒死病人
- D. 哮喘病人
- E. 气管异物

130. 测量呼吸的方法, 错误的是(A)

- A. 测量前向病人解释以取得合作
- B. 观察病人胸腹起伏, 一起一伏为一次
- C. 注意呼吸的深度和节律
- D. 正常呼吸测量半分钟数值 $\times 2$
- E. 呼吸异常者测一分钟

131. 热疗促进炎症局限和消退的原理是(C)

- A. 血管扩张, 减轻炎性水肿
- B. 血管扩张, 降低血管通透性
- C. 增强新陈代谢, 提高白细胞吞噬能力
- D. 促进组织内淋巴液和血液的渗出
- E. 血管收缩, 降低血管通透性

132. 热水坐浴的适应症(B)

- A. 急性盆腔炎
- B. 会阴部充血
- C. 月经量过多
- D. 阴道出血
- E. 急性胸膜炎

133. 热湿敷操作中哪项不妥(C)

- A. 局部涂上凡士林
- B. 盖上一层纱布
- C. 用手测试敷布温度
- D. 敷于患部, 盖干毛巾
- E. 每 3-5 分钟更换敷布一次

134. 热水坐浴的适宜温度为(A)

- A. 40-45 摄氏度
- B. 40-43 摄氏度
- C. 38-41 摄氏度
- D. 45-48 摄氏度
- E. 以上都可以

135. 为长期作肌肉的注射的病员注射, 下列操作哪项不正确(C)

- A. 避开血管
- B. 避开或减少硬结的发生
- C. 固定注射部位
- D. 用细长针头
- E. 排尽空气

136. 消化道疾病患者, 咀嚼不便的患者采用(C)

- A. 普通饮食
- B. 软质饮食
- C. 半流质饮食
- D. 流质饮食
- E. 以上答案均不对

137. 下列哪种病人不需记录液体出入量(B)

- A. 肾衰
- B. 肝硬化腹水
- C. 大面积烧伤
- D. 糖尿病
- E. 肾盂肾炎

138. 成人饮食中每日蛋白质含量不超过 0.8g/kg 用于(D)

- A. 营养不良, 贫血病人
- B. 伤寒病人
- C. 肾病综合症病人
- D. 肝昏迷病人
- E. 孕妇

139. 为增加组织修补能力应给予(A)

A. 蛋白质 B. 碳水化合物 C. 维生素 D. 脂肪 E. 微量元素

140. 含纤维素多的饮食哪种病人禁用(E)

A. 糖尿病 B. 贫血 C. 腹水 D. 动脉硬化 E. 腹泻

141. 低盐饮食是指每天限用食盐量为(D)

A. 5g B. 4g C. 3g D. 2g E. 1g

142. 鼻饲流质饮食的适宜温度为(C)

A. 30-32℃ B. 30-36℃ C. 38-40℃ D. 40-42℃ E. 42-44℃

143. 不妥的药物标签是(D)

A. 内服用药蓝色边 B. 外用药用红色边 C. 剧毒药用黑色边

D. 药名应用中文, 不可用外文 E. 瓶签上可涂蜡保护

144. 使用下列哪些药物时须测心率(B)

A. 巴比妥、安定 B. 洋地黄、奎尼丁 C. 心得安、回苏灵

D. 强的松、地塞米松 E. 异丙嗪、氯丙嗪

145. 应远离明火处保存的药物是(C)

A. 抗毒血清 B. 胎盘球蛋白 C. 乙醚、乙醇

D. 肾上腺素 E. 以上均不是

146. 遇光易变质的药物是(A)

A. 盐酸肾上腺素 B. 过氧乙酸 C. 胎盘球蛋白

D. 干酵母片 E. 复方氢氧化铝片

147. 皮内注射过程中, 下列哪项是错的(E)

A. 无菌操作 B. 严格核对 C. 用 75%乙醇消毒皮肤

D. 针尖与皮肤呈 5 度角刺入 E. 拔针后用无菌棉签按压针眼

148. 立即给药的外文缩写为(A)

A. st B. prn C. iv D. qid E. sc

149. 长期服用苯巴比妥的常见副作用是(B)

A. 中毒 B. 成瘾 C. 药物热 D. 腹泻 E. 结晶尿

150. 不属青霉素过敏性休克循环衰竭的临床表现是(E)

A. 发绀 B. 血压下降 C. 面色苍白、出冷汗

D. 脉搏弱 E. 幻觉、谵妄

二. 多选题

1. 患者马女士, 78 岁, 今日出院, 下列措施中正确的包括(ABC)
A. 为患者办理出院手续 B. 停止患者病区内的治疗 C. 给予患者卫生指导
D. 铺好暂空床迎接新患者 E. 催促患者立即出院
2. 下列药物, 药瓶标签用蓝色边的是 (AC)
A. 奥美拉唑 B. 乙醇 C. 盐酸二甲双胍 D. 碘酊 E. 乙醚
3. 静脉注射选择的血管应(AC)
A. 较粗直 B. 靠关节处 C. 弹性好 D. 靠静脉瓣处
E. 无脂肪肌肉处
4. 下列哪些药物容易引起过敏反应, 用前必须做过敏试验(AC)
A. 普鲁卡因、细胞色素 B. 四环素、红霉素 C. 泛影葡胺、破伤风抗毒素
D. 速尿、甘露醇 E. 以上都不是
5. 应放在 4℃ 冰箱内保存的药物是(BC)
A. 乙醇 B. 青霉素皮试液 C. 丙球蛋白 D. 胃舒平 E. 糖衣片
6. 注射链霉素出现毒性反应的急救药物是 (BD)
A. 乳酸钙 B. 氯化钙 C. 溴化钙 D. 葡萄糖酸钙 E. 糖皮质激素
7. 下列哪些为七对内容(BD)
A. 性别 B. 药名、用法 C. 性反应 D. 浓度、剂量 E. 年龄
8. 过敏性休克在短时间内出现哪些症状(ABCD)
A. 呼吸道阻塞症状 B. 循环衰竭症状 C. 中枢神经系统症状
D. 皮肤过敏反应症状 E. 消化系统过敏症状
9. 婴幼儿肌肉注射的最佳部位是(BD)
A. 臀大肌 B. 臀中肌 C. 三角肌 D. 臀小肌 E. 股外侧肌
10. 青霉素试验结果阳性者应在其上醒目的注明青霉素阳性反应是 (ABCDE)
A. 医嘱单 B. 体温单 C. 门诊卡 D. 注射卡 E. 床头卡
11. 导尿的适应证正确的是(ABCD)
A. 收集尿标本作细菌培养 B. 为尿储留病人放出尿液 C. 必要的术前准备
D. 膀胱容量测量 E. 刀口痛, 不敢用力小便者
12. 尿潴留的临床表现是(ACDE)
A. 下腹胀痛不适 B. 有膀胱刺激症状

- C. 可见耻骨上膨隆 D. 扣及有囊样包块
- E. 自觉有尿排不出来
13. 尿失禁病人常见的并发症有 (BD)
- A. 肾小球肾炎 B. 压疮 C. 盆腔炎
- D. 尿路感染 E. 肾结核
14. 全日尿量增多的疾病有 (AC)
- A. 糖尿病 B. 膀胱结石 C. 尿崩症 D. 心力衰竭 E. 膀胱炎
15. 须为病人留置导尿管的情况有 (BDE)
- A. 收集无菌尿标本 B. 昏迷状态 C. 测足残余尿
- D. 大小便失禁 E. 膀胱手术后
16. 用 0.2% 肥皂水作大量不保留灌肠, 可用 (BCD)
- A. 解除孕妇便秘 B. 产妇产前准备 C. 消除肠道有毒物质
- D. 肠道手术前准备 E. 为中暑者降温
17. 大量不保留灌肠可用于 (ABCE)
- A. 软化和清除粪便 B. 清洁肠道 C. 稀释和清除肠道内有害物质
- D. 减轻腹部术后肠胀气 E. 为高热病人降温
18. 灌肠时压力宜低的病情是 (CD)
- A. 作胆囊切除术前 B. 作乙状结肠检查时 C. 10% 水合氯醛灌肠
- D. 伤寒病人 E. 高热病人降温
19. 对便秘病人进行预防便秘知识教育的内容是 (ABCD)
- A. 定时排便 B. 适当下床活动 C. 多食蔬菜、水果
- D. 摄取适量油脂食物 E. 每晚睡前使用开塞露
20. 便秘是由于 (ABCDE)
- A. 饮水太少 B. 食物中缺乏粗纤维 C. 肠蠕动减慢
- D. 病人缺乏活动 E. 无按时排便习惯
21. 低脂肪饮食适用于 (ACD)
- A. 冠心病 B. 结核病 C. 胆道疾病 D. 高脂血症 E. 急性肾炎
22. 属于治疗饮食的是 (ABE)
- A. 低脂饮食 B. 要素饮食 C. 流质饮食 D. 胆囊造影饮食 E. 无盐饮食
23. 下列哪些属于试验饮食 (BD)

- A. 无盐饮食 B. 高脂肪饮食 C. 流质饮食 D. 隐血饮食 E. 要素饮食
24. 食物当中所含营养素有(ABC)
- A. 蛋白质 B. 糖 C. 维生素 D. 氮无机盐 E. 镁无机盐
25. 高血脂病人可以进食(CDE)
- A. 蛋黄 B. 兔脑 C. 花生 D. 蔬菜 E. 水果
26. 打开无菌包时应注意(ABCE)
- A. 消毒的日期是否过期 B. 无菌包是否潮湿 C. 选择一个宽敞的地方操作
- D. 开包后即属污染, 不可再用 E. 手不可触及包布的内面
27. 普通饮食原则(ADE)
- A. 营养素平衡 B. 少食多餐 C. 食物要易于咀嚼
- D. 易消化无刺激性 E. 少用含糖高油煎的食物
28. 可采用鼻饲法的病情是(ACE)
- A. 昏迷 B. 食管癌 C. 早产婴儿
- D. 食管胃底静脉曲张 E. 破伤风
29. 影响消化吸收的因素有(ACDE)
- A. 食物的色香味 B. 病员的体位 C. 病员的情绪
- D. 进食规律 E. 进食的规律
30. 要素饮食的营养成分包括(BCDE)
- A. 蛋白质 B. 游离氨基酸 C. 单糖 D. 脂肪酸 E. 维生素
31. 禁用冷疗的部位是(ADE)
- A. 枕后 B. 腹股沟 C. 肘窝 D. 腹部 E. 耳廓 阴囊
32. 足底用冷易导致(BC)
- A. 反射性血管扩张 B. 反射性末梢血管收缩影响散热
- C. 一过性冠状动脉收缩 D. 局部敏感容易冻伤 E. 皮下出血和肿胀
33. 心前区用冷可致(AB)
- A. 反射性心率减慢 B. 心房, 心室纤颤及传导阻滞
- C. 高血压 D. 腹泻 E. 体温升高
34. 冷疗法临床常用在(AB)
- A. 鼻出血 B. 脑水肿 C. 牙痛 D. 腹痛 E. 腰肌劳损

35. 禁用热疗的疾病是(ABCD)

- A. 各种脏器的内出血
- B. 急腹症未确诊前
- C. 面部危险三角区感染化脓时
- D. 恶性病变时
- E. 股肌劳损

36. 酒精擦浴禁忌擦哪些部位(ACE)

- A 后颈部
- B. 腋下部
- C. 胸部
- D. 脊部
- E. 腹部

37. 使用热水袋的过程中哪项是错误的(AE)

- A. 热水袋内装水应为二分之一到三分之一满
- B. 排出热水袋内空气
- C. 拧紧塞子, 擦干水袋
- D. 倒提抖动, 观察是否漏气
- E. 不漏水, 即可放于所需部位

38. 乙醇擦浴前头部置冰袋的目的是(BE)

- A. 防止反射性心率减慢
- B. 降低头部温度
- C. 减少脑细胞需氧量
- D. 防止脑水肿
- E. 防止头部充血引起头痛

39. 关于煮沸消毒灭菌法正确的是(ACDE)

- A. 管类物品官腔中应充水并沉入水中
- B. 物品放置一般不超过消毒容器容量的五分之四
- C. 根据物品性质决定放入水的时间
- D. 消毒所需时间应从水沸后算起
- E. 消毒前物品必须刷洗干净

40. 帮助病人入睡的护理措施(ABCE)

- A. 尊重病人的睡眠习惯
- B. 维持环境安静
- C. 保持室温卧室温度
- D. 给病员喝咖啡
- E. 必要时给予止痛药

41. 化学消毒灭菌法包括(ABCD)

- A. 浸泡法
- B. 喷雾法
- C. 熏蒸法
- D. 擦拭法
- E. 照射法

42. 在无菌技术操作过程中, 正确的是(ABCDE)

- A. 无菌巾或无菌包潮湿后即不能再认为无菌的
- B. 夹取无菌物品, 必须使用无菌持物钳
- C. 操作前半小时停止扫地更单等工作
- D. 无菌包的有效期 7 天
- E. 用物疑有污染应予更换

43. 需严密隔离的病人(CE)

- A. 流行性出血热病人 B. 伤寒病人 C. 鼠疫病人
- D. 狂犬病人 E. 霍乱病人

44. 关于过氧乙酸, 正确的操作是(ABCD)

- A. 现用现配 B. 存阴凉处 C. 可用塑料容器保存
- D. 操作时操作者应戴口罩及橡皮手套 E. 用于金属器械的消毒

45. 浸泡器械正确的做法是(ABDE)

- A. 器械应先洗净擦干 B. 具有挥发性消毒液应加盖, 定期测比重
- C. 浸泡 30 分钟 D. 浸泡后的器械, 使用前须用无菌等渗盐水冲洗
- E. 器械应完全浸泡在消毒液中

46. 下列哪种消毒液应现用现配(CE)

- A. 70%酒精 B. 2%碘酊 C. 0. 2%-0. 5%过氧乙酸
- D. 环氧乙烷 E. 漂白粉

47. 使用无菌包应做到(BDE)

- A. 近期灭菌包先用 B. 疑被污染, 应重新消毒灭菌
- C. 被水浸湿时, 立即烤干后用 D. 盛放无菌包处应清洁干燥
- E. 包内用物未用完可原样包扎

48. 无菌容器的使用法, 不正确的是(AC)

- A. 无菌容器消毒后备用, 如不打开不受时间限制
- B. 打开无菌容器盖时, 必须将盖的内面朝上
- C. 容器内无菌物品取出后, 但未使用, 亦未污染, 可放回
- D. 持无菌容器时, 应托住底部, 不可将手指触及容器内面和边缘
- E. 容器应每周消毒一次

49. 侧卧位适用于(ABDE)

- A. 昏迷 B. 术后 C. 作腹部检查 D. 灌肠 E. 下肢瘫痪

50. 需使用保护具的病人是(ABD)

- A. 昏迷病人 B. 谵妄病人 C. 过敏性休克的病人
- D. 高热躁动的病人 E. 呼吸衰竭的病人

内科护理试题部分

一. 单选题

1. 脑卒中患者预防脑血管病发生, 最重要的环节是控制 (A)
A. 高血压 B. 心脏病 C. 糖尿病 D. 血脂异常 E. 心肌梗死
2. 脑血栓形成最常见的病因是 (C)
A. 高血压 B. 糖尿病 C. 动脉粥样硬化 D. 高血脂 E. 脑血栓
3. 以粪一口传播为主要传播途径的病毒性肝炎类型是 (A)
A. 甲型、戊型肝炎 B. 乙型肝炎 C. 丙型肝炎 D. 丁型肝炎 E. 以上都不是
4. 急性肾盂肾炎病人最常见的是 (D)
A. 尿蛋白 (++) B. 尿红细胞 > 3 个/HP
C. 菌落计数 10^4 /ml D. 尿白细胞 > 5 个/HP E. 以上都不是
5. 护士对慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 患者进行呼吸锻炼的指导, 正确的是 (D)
A. 经口吸气 B. 经鼻呼气
C. 呼气时腹肌放松, 腹部鼓起 D. 吸气与呼气时间比为 1: 2
E. 以上都不是
6. 患者, 女性, 47 岁, 主因“关节疼痛 3 年, 加重伴关节畸形”就诊, 初步诊断为类风湿关节炎。下列检查中对明确诊断和对关节病变进行分期, 监察病情变化均有重要价值的是 (D)
A. C 反应蛋白 B. 关节滑液 C. 类风湿因子
D. 关节影像学 E. 以上都不是
7. 患者, 女性, 72 岁, 因慢性心力衰竭长期服用洋地黄类药物治疗, 近日出现疲乏、食欲减退、头痛、头晕、黄视等症状, 应首先考虑其发生了 (B)
A. 左心衰竭加重 B. 洋地黄类药物中毒
C. 电解质紊乱 D. 继发感染 E. 以上都不是
8. 对慢性再障疗效较好的药物为 (D)
A. 抗淋巴细胞球蛋白 B. 抗胸腺细胞球蛋白
C. 重组人粒系集落刺激因子 D. 雄激素 E. 以上都不是
9. 患者, 女性, 79 岁, 因胸闷伴呼吸困难 2 小时就诊。门诊查心电图示心房扑动。转复心房扑动律最有效的方法是 (A)
A. 同步直流电复律 B. 非同步直流电复律

- C. 静点胺碘酮 D. 口服洋地黄制剂 E. 以上都不是
10. 患者, 男性, 25 岁, 在工作中检修设备时, 因煤气泄漏外溢, 吸入大量煤气致昏迷。以急性一氧化碳中毒入院。入院后该患者宜立即接受的最佳治疗措施是 (A)
- A. 高压氧治疗 B. 血液透析 C. 吸入纯氧 D. 血液灌流 E. 静脉输葡萄糖
11. 患者, 男性, 78 岁, 因着凉后突发呼吸困难, 端坐位, 急诊入院。初步诊断为“急性左心衰竭”, 为缓解患者呼吸困难, 应将患者吸氧流量调节至 (D)
- A. 1-2L / min B. 3-4L / min C. 4-5L / min D. 6-8L / min E. 4-6L / min
12. 肝硬化患者出现顽固性腹水时, 临床较好的治疗方法是 (D)
- A. 大量放腹水 B. 限制钠水摄入 C. 输注白蛋白
- D. 自身腹水浓缩回输 E. 以上都不是
13. 患者, 男性, 58 岁, 因“剧烈腹泻、呕吐 1 天”急诊入院。患者自述 1 周前曾饮用不洁水, 拟诊为“霍乱”, 该患者治疗的关键是 (B)
- A. 抗菌治疗 B. 补液治疗 C. 强心治疗 D. 抗病毒治疗 E. 以上都不是
14. 临床上淡漠型甲亢多见于 (D)
- A. 儿童 B. 育龄女性 C. 成年男性 D. 老年人 E. 青少年
15. 目前控制支气管哮喘急性发作的首选药物是 (A)
- A. β_2 受体激动剂 B. 抗胆碱能药物 C. 茶碱类药物
- D. 糖皮质激素 E. 磺胺类药物
16. 患者, 女性, 73 岁, 主因“慢性心力衰竭, 急性加重”急诊入院。患者端坐呼吸, 大汗淋漓, 极度烦躁不安。遵医嘱给予吗啡镇静治疗。用药后护士需关注患者有无 (C)
- A. 电解质紊乱 B. 神志淡泊 C. 呼吸抑制
- D. 血管神经性水肿 E. 嗜睡
17. 患者, 女性, 30 岁, 患肺结核 5 年余, 今日呼吸道感染后症状加重, 咯鲜血数次, 一天内咯血量约 60ml。该患者咯血量属于 (A)
- A. 小量 B. 中量 C. 大量 D. 极大量 E. 以上都不是
18. 癫痫持续状态的治疗中, 为迅速控制抽搐, 首选药物是 (A)
- A. 地西洋 B. 水合氯醛 C. 异戊巴比妥 D. 乙琥胺 E. 以上都不是

19. 患者，女性，79 岁，因胸闷伴呼吸困难 2 小时就诊。门诊查心电图示心房扑动。转复心房扑动律最有效的方法是（ A ）

- A. 同步直流电复律 B. 非同步直流电复律
C. 静点胺碘酮 D. 口服洋地黄制剂 E. 以上都不是

20. 特发性血小板减少性紫癜中慢性型患者多为（ D ）

- A. 儿童 B. 男性 C. 老年人 D. 青年女性 E. 中年男性

21. 患者，女性，56 岁。因病态窦房结综合征入院治疗并植入一枚人工心脏起搏器。患者出院前复述护士给予的健康指导内容，其中理解错误的一项是（ B ）

- A. 定期随访测定起搏器功能 B. 安装起搏器后，避免任何运动
C. 避免接触高压电等发放强电磁波物体
D. 数脉搏小于起搏器设置频率应立即就诊 E. 以上都不是

22. 患者，男性，60 岁，因第二度 II 型房室传导阻滞入院，曾发作阿-斯综合征一次，则该患者首选的治疗措施为（ D ）

- A. 静脉给予阿托品 B. 异丙肾上腺素口服 C. 非同步心脏电复律
D. 植入永久性心脏起搏器 E. 以上都不是

23. 对冠心病具有诊断价值，并且对选择治疗方案和判断预后极为重要的一项检查为（ D ）

- A. 24 小时动态心电图 B. 心肌放射性核素检查
C. 冠状动脉 CT D. 冠状动脉造影 E. 以上都不是

24. 下列甲亢中最常见的 Graves 病的症状中，属于高代谢症候群的是（ B ）

- A. 失眠 B. 怕热、多汗、低热 C. 大便频数 D. 心率增快 E. 嗜睡

25. 患者，女性，29 岁，因“月经量过多伴乏力半年”门诊就诊。查体可见四肢皮肤黏膜散在出血点，血小板计数 $45 \times 10^9 / L$ ，初步诊断为“特发性血小板减少性紫癜”，该患者首选的治疗应是（ D ）

- A. 输注浓缩血小板 B. 血浆置换 C. 脾切除
D. 糖皮质激素治疗 E. 以上都不是

26. 白血病确诊的主要依据是患者的（ B ）

- A. 末梢血分类检查 B. 骨髓象检查 C. 细胞化学染色
D. 血尿酸浓度检查 E. 白细胞计数

27. 患者，男性，40 岁，因“重型溃疡性结肠炎”入院。近 1 天来，患者出现腹泻加重，腹痛、腹胀明显，肠鸣音消失，复查电解质血钾 2.8mmol/L 。目前，该患者最可能发生的并发症是（ D ）

- A. 结肠梗阻 B. 结肠癌变 C. 结肠大出血
D. 中毒性巨结肠 E. 结肠炎

28. 类风湿关节炎所致疼痛最常出现的部位是（ A ）

- A. 腕、掌指关节、近端指关节 B. 肘关节 C. 足趾、踝关节
D. 肩关节、髋关节 E. 以上都不是

29. 甲亢初始治疗的首选方法是（ C ）

- A. 放射性碘治疗 B. 替代治疗 C. 抗甲状腺药物治疗
D. 手术治疗 E. 以上都不是

30. 患者，男性，22 岁，3 天前受凉后出现高热，体温最高达 39°C ，伴咳嗽、咳痰，为黄色黏痰，初步诊断为“肺炎”。为进一步明确致病菌，医嘱留取痰标本进行细菌培养。护士在进行痰标本留取时，正确的做法是（ B ）

- A. 随机留取一口痰液 B. 嘱患者用力咳出深部痰液
C. 痰标本置于无盖容器方便检测 D. 痰标本静置 3 小时后送检
E. 以上都不是

31. 左心衰竭最早出现的症状为（ A ）

- A. 呼吸困难 B. 咳嗽 C. 咯血 D. 颈静脉怒张 E. 以上都不是

32. 引起心源性脑栓塞最常见的原因是（ C ）

- A. 风湿性心脏病 B. 心肌梗死 C. 房颤
D. 感染性心内膜炎 E. 高血压

33. 患者，男性，45 岁，因肝硬化腹水入院。入院后第二天夜间出现躁动不安、随地便溺、四肢肌肉张力增高。为给予患者镇静，下列药物禁止使用的是（ A ）

- A. 吗啡 B. 东莨菪碱 C. 异丙嗪 D. 扑尔敏 E. 以上都不是

34. 目前认为对于诊断早期肝性脑病包括亚临床脑病最有效的检查是（ C ）

- A. 血氨测定 B. 诱发电位 C. 简单智力测验
D. 脑电图 E. 肝功能

35. 变异型心绞痛患者首选治疗药物是（ C ）

- A. 硝酸酯类 B. β 受体阻滞剂 C. 钙离子拮抗剂
- D. 抗血小板聚集药 E. 以上都不是
36. 导致甲状腺功能亢进症最常见的病因是 (D)
- A. 自身免疫性甲状腺炎 B. 结节性毒性甲状腺肿 C. 甲状腺自主高功能腺瘤
- D. 毒性弥漫性甲状腺肿(Graves 病) E. 以上都不是
37. 溃疡性结肠炎患者急性活动期应进食 (C)
- A. 温凉流食 B. 少渣饮食 C. 无渣流质饮食
- D. 低蛋白流食 E. 普通饮食
38. 下列关于慢性肾小球肾炎病因和发病机制的叙述正确的是 (A)
- A. 大多数病因不清楚 B. 少数起病时即为慢性过程
- C. 发病的起始因素主要是非免疫非炎症因素
- D. 免疫介导炎症在疾病发展中占重要地位 E. 以上都不是
39. 患者, 女性, 78 岁, 确诊慢性阻塞性肺疾病(COPD)近 10 年。近日门诊随访时社区医生根据患者血气分析结果嘱其需长期家庭氧疗, 据此可知患者血气分析结果符合 (A)
- A. $\text{PaO}_2 < 55\text{mmHg}$ B. $\text{PaCO}_2 > 55\text{mmHg}$ C. $\text{PaO}_2 \leq 65\text{mmHg}$
- D. $\text{PaCO}_2 \geq 65\text{mmHg}$ D. $\text{PaCO}_2 \geq 75\text{mmHg}$
40. 患者, 男性, 75 岁。1 天前突发房颤急诊入院, 查体: T 36.8°C , P 72 次/分, BP 125/75mmHg, HR 128 次/分。目前该患者的临床症状主要取决于 (B)
- A. 脉率的快慢 B. 心室率的快慢 C. 血压的控制情况
- D. 房颤持续的时间 E. 以上都不是
41. 导致腺垂体功能减退症最常见的病因是 (A)
- A. 垂体瘤 B. 下丘脑病变 C. 垂体缺血性坏死
- D. 感染和炎症 E. 以上都不是
42. 治疗肾性贫血的特效药是 (B)
- A. 铁剂 B. 重组促人红细胞生成素 C. 叶酸 D. 新鲜血液 E. 以上都不是
43. 系统性红斑狼疮病人较常见 (D)
- A. 心包炎 B. 狼疮性肾炎 C. 消化道出血
- D. 关节与肌肉疼痛 E. 肺部感染

44. 计算基础代谢率 (BMR) 的公式是 (A)
- A. $BMR = \text{脉率} + \text{脉压} - 111$ B. $BMR = \text{脉率} + \text{收缩压} - 111$ C. $BMR = \text{脉率} + \text{舒张压} - 111$
D. $BMR = \text{脉率} + \text{脉压}$ E. $BMR = \text{脉率} + \text{收缩压}$
45. 肺癌最常见的早期症状是 (A)
- A. 刺激性呛咳 B. 胸闷、气急 C. 胸痛 D. 血痰 E. 发热
46. 成人脉压大于 5kpa 可见于 (D)
- A. 甲状腺功能减退 B. 心包积液 C. 严重二尖瓣狭窄
D. 主动脉瓣关闭不全 E. 主动脉瓣狭窄
47. 肝硬化病人不宜大量放腹水, 因可导致 (A)
- A. 肝性脑病 B. 脱水 C. 上消化道出血 D. 电解质紊乱 E. 蛋白质丢失
48. 有幽门梗阻者行胃镜检查前 2-3 天应给予 (A)
- A. 禁食 B. 半流食 C. 低脂半流食 D. 少渣普食 E. 流食
49. 缺氧的典型表现是 (B)
- A. 呼吸困难 B. 发绀 C. 意识障碍 D. 肺功能下降 E. 球结膜水肿
50. 长期卧床的慢性心功能不全病人, 其水肿的分布特点是 (D)
- A. 以踝内侧明显 B. 以胫前部明显 C. 以颜面部明显
D. 以腰背部、骶尾部明显 E. 以四肢明显
51. 诱发尿毒症的主要原因是 (D)
- A. 贫血 B. 心力衰竭 C. 酸中毒 D. 继发感染 E. 电解质紊乱
52. 男性, 58 岁, 有高血压病史, 某日, 在与朋友共进晚餐时, 饮白酒半斤, 回家后突感头痛剧烈, 头晕, 呕吐, 不能站立, 左侧肢体活动障碍, 行走不稳。你考虑病人可能患有 (A)
- A. 内囊出血 B. 脑血栓形成 C. 脑栓塞
D. 短暂脑缺血发作 E. 高血压危象
53. 环磷酰胺主要的不良反应是 (D)
- A. 心脏损害 B. 脱发 C. 胃肠道反应 D. 出血性膀胱炎 E. 口腔溃疡
54. 慢性肺心病长期氧疗, 每日持续吸氧时间应超过 (E)
- A. 7 小时 B. 9 小时 C. 10 小时 D. 12 小时 E. 15 小时
55. 系统性红斑狼疮最常见的死亡原因是 (C)

- A. 心肌炎 B. 颅内高压 C. 尿毒症 D. 上消化道大出血 E. 胸膜炎
56. 护理慢性肾功能衰竭，最重要的是（ D ）
- A. 每日测血压 2 次 B. 每日测体重 1 次 C. 每日测体温 1 次
- D. 每日记出入液量 E. 每日尿液检查 1 次
57. 呕吐严重且呕吐量大的疾病是（ C ）
- A. 急性胃炎 B. 肠梗阻 C. 幽门梗阻 D. 急性阑尾炎 E. 急性胆囊炎
58. 中性粒细胞增多，多见于（ C ）
- A. 过敏性疾病 B. 抗肿瘤药物用药后 C. 急性感染
- D. 寄生虫病 E. 脾功能亢进
59. 急性肾盂肾炎最重要的护理措施是（ C ）
- A. 卧床休息 B. 观察药物副作用 C. 多饮水
- D. 每日留尿送检 E. 高锰酸钾坐浴
60. 甲状腺功能亢进危象先兆的表现是（ E ）
- A. T₃、T₄ 升高 B. 体温 37.5℃ C. 呕吐、腹泻
- D. 脉率 110 次/min E. 神情焦虑、烦躁
61. 成人女性血红蛋白正常参考值范围是（ B ）
- A. 100-140g/L B. 110-150g/L C. 120-160g/L
- D. 140-170g/L E. 170-200g/L
62. 特发性血小板减少紫癜治疗是应慎重的使用的是（ E ）
- A. 抗生素 B. 糖皮质激素 C. 脾切除 D. 输血 E. 免疫抑制剂
63. 再生障碍性贫血一般不出现（ B ）
- A. 网织红细胞减少 B. 红细胞形态改变 C. 红细胞减少
- D. 白细胞减少 E. 血小板减少
64. 女性，28 岁，甲状腺功能亢进病史半年，妊娠 3 个月后，甲状腺功能亢进症状加重，治疗宜选（ D ）
- A. 甲巯咪唑 B. 卡比马唑 C. 甲基硫氧嘧啶
- D. 丙基硫氧嘧啶 E. 普萘洛尔
65. 慢性肺心病发生的关键环节是（ A ）
- A. 肺动脉高压 B. 左心室肥厚 C. 右心室扩大
- D. 体循环淤血 E. 心功能不全

66. 评估急性胰腺炎病人的病情, 哪项最能说明预后不佳 (E)
- A. 体温 39℃ B. 黄疸 C. 合并代谢性中毒
- D. 全腹压痛、腹肌紧张 E. 手足抽搐
67. 心绞痛发作的首要护理措施是 (D)
- A. 立即描记心电图 B. 观察疼痛性质 C. 给予吸氧
- D. 让病人安静坐下或半卧 E. 建立静脉通路
68. 不属于胃癌癌前情况的是 (E)
- A. 慢性萎缩性胃炎 B. 胃息肉 C. 残胃炎 D. 恶性贫血 E. 进展期胃癌
69. 诊断肺心病的主要依据是 (A)
- A. 肺动脉高压及右心室肥厚 B. 肺性脑病 C. 肺气肿体征
- D. 长期慢支及肺部疾患史 E. 心电图见“肺型 P 波”
70. 需要特别护理的病人是 (D)
- A. 老年体弱者 B. 高热病人 C. 卧床休息病人
- D. 瘫痪病人 E. 手术后病人
71. 肝性脑病合并碱中毒时应选用 (B)
- A. 谷氨酸 B. 精氨酸 C. 鸟氨酸 D. 色氨酸 E. 半胱氨酸
72. 有机磷农药中毒原理是 (B)
- A. 使胆碱酯酶活性增加 B. 使乙酰胆碱在体内蓄积 C. 抑制呼吸中枢
- D. 直接作用于中枢神经 E. 直接作用于心肌引起循环衰竭
73. 原发性高血压最常见的死亡原因是 (E)
- A. 尿毒症 B. 心律失常 C. 心力衰竭 D. 高血压危象 E. 脑血管意外
74. 可判断类风湿性关节炎活动度指标的是 (C)
- A. 关节疼痛 B. 关节肿胀 C. 晨僵 D. 关节畸形 E. 关节功能障碍
75. 某缺铁性贫血病人, 需口服硫酸亚铁, 指导服用方法应 (B)
- A. 饭前服用 B. 饭后服用 C. 间隔 8 小时一次
- D. 任何时间都可以 E. 睡前服一次
76. 风湿性心脏病并发何种心律失常, 易引起栓塞 (C)
- A. 窦性心动过缓 B. 窦性心动过速 C. 心房颤动
- D. 过早搏动 E. 第三度房室传导阻滞
77. 肢体可脱离床面, 但不能抵抗阻力, 此时的肌力为 (D)

A. 0 级 B. 1 级 C. 2 级 D. 3 级 E. 4 级

78. 风湿性疾病多系统损害中发生率最高的是 (B)

A. 肾脏 B. 关节 C. 心血管 D. 肺和胸膜 E. 皮肤

79. 肝硬化导致门脉高压的表现有 (A)

A. 腹水 B. 上腹饱胀 C. 蜘蛛痣 D. 大隐静脉曲张 E. 颈静脉怒张

80. 某呼吸衰竭病人, 应用辅助呼吸和呼吸兴奋剂过程中, 出现恶心、呕吐、烦躁、面颊潮红、肌肉颤动等现象应考虑 (C)

A. 肺性脑病先兆 B. 通气量不足 C. 呼吸兴奋剂过量
D. 呼吸性碱中毒 E. 痰液阻塞

二. 多选题

1. 下列对慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者的健康教育, 正确的是 (ABCE)

A. 积极参与 COPD 的长期管理可减少急性发作
B. 避免各种致病因素, 如吸烟
C. 坚持呼吸肌训练, 每次 10-15 分钟
D. 急性发作期应去医院接受无创正压呼吸机给氧
E. 坚持全身活动

2. 患者, 男性, 78 岁, 因“慢性阻塞性肺疾病、II 型呼吸衰竭”入院。患者神志不清, 呼吸浅慢, 医嘱给予气管插管呼吸机辅助通气治疗。护士在给患者进行吸痰操作时, 正确的是 (BCE)

A. 吸引负压为 60-80mmHg B. 插入吸痰管时应关闭负压
C. 每次吸痰时间不超过 15 秒 D. 痰量较多可以连续多次吸痰
E. SpO₂<90%应暂停吸痰

3. 糖尿病微血管病变包括 (BDE)

A. 肾动脉硬化 B. 糖尿病肾病 C. 缺血性脑血管病
D. 糖尿病视网膜病变 E. 神经病变

4. 护士对哮喘患者进行定量雾化吸入器的使用指导中, 正确的是 (ABD)

A. 吸入前摇匀药液 B. 呼气至不能再呼, 将喷嘴放入口中。
C. 经鼻吸气同时按压驱动装置 D. 吸入药物后尽可能屏气 10 秒
E. 吸入后快速用力呼气以利药物吸收

5. 下列因素中可导致实性心动过速的有 (ABCE)
- A. 吸烟 B. 剧烈运动 C. 饮酒 D. 睡眠状态 E. 情绪激动
6. 下列关于肾病综合征并发症的叙述, 正确的是 (ACD)
- A. 血栓栓塞以肾静脉血栓最多见 B. 感染是少见并发症
- C. 急性肾衰竭与有效循环血量不足有关 D. 长期低蛋白会导致内分泌紊乱
- E. 一般不会出现脂代谢紊乱
7. 病毒性心肌炎急性期增高的血清心肌损伤标志物中, 敏感性及特异性最强的是 (CD)
- A. CK B. CK—MB C. cTnT D. cTnI E. AST
8. Graves 病患者甲状腺肿大的特点描述, 正确的是 (ADE)
- A. 弥漫性肿大 B. 非对称 C. 质硬如石
- D. 可听到血管杂音 E. 可触到震颤
9. 下列关于急性胰腺炎饮食护理措施中正确的是 (ACE)
- A. 禁食 B. 口渴者可少量喝水 C. 腹胀者给予胃肠减压
- D. 可以进食后, 从低脂高糖流食开始 E. 恢复正常饮食后少量多餐
10. 干燥综合征患者局部表现中的口干燥症包括 (ABC)
- A. 口干 B. 猖獗性龋齿 C. 腮腺炎 D. 咽峡炎 E. 扁桃体炎
11. 下列治疗肺结核的药物中, 属于全效杀菌药的是 (AC)
- A. 异烟肼 B. 吡嗪酰胺 C. 利福平 D. 链霉素 E. 乙胺丁醇
12. 系统性红斑狼疮患者皮肤护理措施正确的是 (ADE)
- A. 避免阳光较强的时间外出 B. 宜用强碱性肥皂清洁皮肤
- C. 最好用冷水洗脸 D. 勿用各类化妆品
- E. 指甲勿修剪过短
13. 慢性再障青年女性患者采用丙酸睾酮治疗期间, 护士给予的药物指导正确的是 (ABC)
- A. 药物所致男性化作用在停药后可消失
- B. 该药为油剂, 吸收慢易发牛肿块. 应及时检查
- C. 药物可导致闭经 D. 用药期间应定期检查肾功能
- E. 应定期查凝血时间和部分凝血活酶时间

14. 白血病诱导缓解治疗期间，提示患者已达到完全缓解的标准有（ ABE ）
- A. 白血病的症状、体征消失
 - B. 骨髓象基本正常
 - C. 中性粒细胞绝对值 $\geq 1.0 \times 10^9 / L$
 - D. 外周血分类中原始、幼稚白血病细胞 $\leq 5\%$
 - E. 红系、巨核系正常
15. 下列关于肝性脑病的饮食护理措施中，正确的是（ ABE ）
- A. 开始数日禁食蛋白质
 - B. 神志清楚后，逐渐增加蛋白质
 - C. 以优质的动物蛋白为主
 - D. 多进食脂肪含量高的食物
 - E. 饮食含丰富维生素
16. 患者，男性，57 岁。近半年来于运动或劳累后间断出现胸骨后憋闷感，门诊初步诊断为稳定型心绞痛，则该患者静息心电图可表现为（ ABD ）
- A. 正常
 - B. ST 段下移 $\geq 0.1mV$
 - C. ST 段弓背上抬 $\geq 0.1mV$
 - D. T 波倒置
 - E. T 波高尖
17. 患者，男性，40 岁，诊断为“肾病综合征”，医嘱给予口服泼尼松治疗。责任护士在给患者进行的用药指导中正确的是（ BC ）
- A. 从小剂量开始
 - B. 减撤药要慢
 - C. 维持用药要久
 - D. 每日早晚 8 时顿服
 - E. 维持阶段每日晚 8 时顿服
18. 下列关于肺结核患者消毒、隔离的措施正确的是（ ABDE ）
- A. 肺结核涂阳患者进行呼吸道隔离
 - B. 患者咳嗽时用双层纸巾遮住口鼻
 - C. 痰液吐入带盖容器与等量 75%酒精混合浸泡
 - D. 衣物可采用烈日暴晒消毒
 - E. 接触痰液后用流动水清洗双手
19. 患者，男性，55 岁，因“支气管扩张、咯血”入院。入院后当晚剧烈咳嗽，咯鲜血数口后，突然出现咳嗽停止、表情紧张、双手紧握喉头，全身抽动、倒地。值班护士判断患者出现咯血窒息。则下列措施中正确的是（ BCE ）
- A. 置患者于仰卧位、头底脚高
 - B. 拍患者背部促进积血排出
 - C. 必要时进行气管插管
 - D. 气道通畅后给予持续低流量吸氧
 - E. 必要时进行机械通气
20. 护士对慢性阻塞性肺疾病患者进行缩唇腹式呼吸的指导中正确的是（ BCD ）

- A. 开始训练时采用立位，双腿屈曲
- B. 呼气时缩拢嘴唇
- C. 呼气时腹肌收缩
- D. 呼吸时使胸廓保持最小活动度
- E. 吸气与呼气的的时间比为 2:1

外科护理试题部分

一. 单选题

1. 正常成人 24 小时液体出入量为 (D)
 - A. 1000ml
 - B. 1000—2000ml
 - C. 1500—2000ml
 - D. 2000—2500ml
 - E. 2500—3000ml
2. 细胞内液的主要阳离子是 (B)
 - A. 钠离子
 - B. 钾离子
 - C. 镁离子
 - D. 钙离子
 - E. 以上都是
3. 高渗性脱水最早出现的症状是 (C)
 - A. 尿少
 - B. 皮肤弹性减退，粘膜干燥
 - C. 口渴
 - D. 眼眶及小儿前囟凹陷
 - E. 发热、昏迷、惊厥
4. 正在输液的病人出现心率过速、呼吸急促、咳嗽，有血性泡沫样痰应考虑 (D)
 - A. 急性肾功能衰竭
 - B. 输液反应
 - C. 输液量不足
 - D. 左心衰及肺水肿
 - E. 严重脱水
5. 急性肠梗阻病人出现呼吸深而快，二氧化碳结合力 18mmol/L，可能是 (C)
 - A. 代谢性碱中毒
 - B. 呼吸性碱中毒
 - C. 代谢性酸中毒
 - D. 呼吸性酸中毒
 - E. 以上都不是
6. 低钾血症病人最早出现的临床表现是 (B)
 - A. 肠麻痹
 - B. 四肢无力
 - C. 心动过缓
 - D. 恶心呕吐
 - E. 血压下
7. 静脉补钾浓度一般不超过 (A)

- A. 0.3% B. 0.5% C. 0.8% D. 1% E. 3%
8. 成年男性体液总量占体重(A)
- A. 60% B. 30% C. 40% D. 50% E. 20%
9. 维持细胞外液渗透压主要离子是(D)
- A. K B. Ca C. Mg D. Na E. H
10. 关于钾的代谢下列哪一项是错误的(D)
- A. 钾是细胞内液主要阳离子 B. 钾的排出主要通过肾脏
- C. 钾的来源全靠食物摄入 D. 肾脏具有保钾排钠的能力
- E. 肾脏具有保钠排钾的能力
11. 休克病人应采取的体位是(E)
- A. 头高足低位 B. 侧卧位 C. 半卧位 D. 头低足高位 E. 中凹卧位
12. 休克代偿期的表现是(D)
- A. 血压稍升高, 脉搏、脉压正常 B. 血压稍降低, 脉搏、脉压正常
- C. 血压稍升高, 脉搏快, 脉压无变化 D. 血压稍升高, 脉搏快, 脉压缩小
- E. 血压稍降低, 脉搏快, 脉压缩小
13. 反映休克患者组织灌流量最简单而有效的指标是(C)
- A. 血压 B. 脉搏 C. 尿量 D. 神志 E. 肢端温度
14. 休克病人在补足液体后, 血压偏低, 中心静脉压正常, 应给予(A)
- A. 强心药 B. 利尿药 C. 血管扩张药 D. 血管收缩药 E. 大量皮质激素
- 为休克病人补充血容量应首选(D)
- A. 全血 B. 血浆 C. 低分子右旋糖酐 D. 平衡盐溶液 E. 5%葡萄糖溶液
16. 在抗休克过程中应用血管扩张剂必须(A)
- A. 在补足血容量之后 B. 与血管收缩剂配合使用 C. 尽早使用
- D. 大剂量使用 E. 持续静脉点滴
17. 休克病人血压和中心静脉压均低, 提示(A)
- A. 血容量严重不足 B. 心功能不全
- C. 血管过度收缩 D. 血容量相对过多 E. 血容量相对不足
18. 反映休克病人病情危重的指标是(E)
- A. 神志淡漠 B. 伴代谢性酸中毒 C. 脉搏细速 120 次/分

- D. 收缩压低于 10.7kPa E. 皮肤出现多处瘀点、瘀斑
19. 剧烈腹泻致失液性休克病人, 下列哪项护理诊断为最主要 (B)
- A. 焦虑 B. 体液不足 C. 活动无耐力
- D. 生活不能自理 E. 知识缺乏
20. 硬膜外麻醉最严重的并发症是 (E)
- A. 血压下降 B. 血管扩张 C. 尿潴留 D. 呼吸变慢 E. 全脊髓麻醉
21. 在吸入麻醉前, 常规使用抗胆碱药物的主要目的是 (C)
- A. 有效地防止支气管痉挛 B. 减少胃肠蠕动 C. 减少呼吸道及唾液分泌
- D. 减少麻醉药的用量 E. 减轻麻醉过程中交感神经的过度兴奋
22. 为防止麻醉时引起呕吐, 一般手术前禁食、禁饮的时间是 (E)
- A. 4 h 禁食、2 h 禁饮 B. 6 h 禁食、4 h 禁饮 C. 8 h 禁食、6 h 禁饮
- D. 6h 禁、8h 禁饮 E. 10h 禁食、6h 禁饮
23. 小儿、老人、孕妇应避免使用哪种麻醉前用药 (A)
- A. 吗啡 B. 杜冷丁 C. 东莨菪碱 D. 安定 E. 苯巴比妥钠
24. 女性, 成人, 拟行阑尾切除术, 在腰麻开始后不久, 收缩压从麻醉前 14.7Kpa 下降至 11.7Kpa。应静脉输液中加入 (B)
- A. 间羟胺 B. 麻黄碱 C. 肾上腺素 D. 多巴胺 E. 去甲肾上腺素
25. 外伤性肝、脾破裂内出血、休克患者, 受伤前半小时曾吃粥一碗, 馒头四两, 需全麻下手术, 除及时补充血容量外, 针对“饱胃”宜 (B)
- A. 置胃管抽吸, 抽空胃内容物 B. 考虑作清醒气管内插管
- C. 用药物或物理性刺激使病人呕出胃内容物 D. 立即作气管切开
- E. 等待至胃排空后再予麻醉
26. 骨科手术前备皮, 正确的是 (B)
- A. 手术前 3 日开始备皮剃毛 B. 术前 3 日起清洗, 术前一剃毛
- C. 术前一清洗并剃毛 D. 手术日晨清洗, 剃毛 E. 清洗 3 日, 不剃毛
27. 结直肠手术前, 除行清洁灌肠外, 还应 (C)
- A. 肌注抗菌素预防感染 B. 应用镇咳药, 防止术后咳嗽
- C. 术前三天开始服用肠道制菌药物
- D. 应用肾上腺皮质激素以增强抵抗力 E. 输血

28. 术前常规禁食的时间是(D)

- A. 禁食 4 小时、禁饮 2 小时
- B. 禁食 6 小时、禁饮 2 小时
- C. 禁食 8 小时、禁饮 3 小时
- D. 禁食 12 小时、禁饮 4 小时
- E. 禁食 10 小时、禁饮 2 小时

29. 手术病人一般在术前 12h 开始禁食、4h 开始禁饮的理由是(B)

- A. 让胃肠道适当的休息
- B. 防止麻醉或手术过程中发生呕吐
- C. 减少胃肠道手术时的污染
- D. 防止术后腹胀
- E. 满足患者的生理需要

30. 下列呼吸道方面的手术前准备中哪项是错误的(D)

- A. 吸烟病人必须停止吸烟 1-2 周
- B. 鼓励病人练习咳嗽
- C. 痰液稠厚者可用雾化吸入
- D. 咳嗽明显者可给与镇咳剂
- E. 指导病人作深呼吸

31. 手术前常规禁食的目的是(B)

- A. 避免胃膨胀而妨碍手术
- B. 防止围手术期的呕吐和误吸
- C. 防止术后膨胀
- D. 防止术后肠麻痹
- E. 防止腹腔感染

32. 下列手术中那种属于限期手术(C)

- A. 胃十二指肠溃疡病的胃大部切除术
- B. 急性阑尾炎的阑尾切除术
- C. 胃癌的根治性手术
- D. 嵌顿疝的疝修补术
- E. 子宫肌瘤

33. 手术后早期恶心、呕吐常见的原因是(B)

- A. 颅内压增高
- B. 麻醉反应
- C. 术后腹胀
- D. 肠梗塞
- E. 肠粘连

34. 福尔马林为多少浓度的甲醛溶液(C)

- A. 10%
- B. 20%
- C. 40%
- D. 60%
- E. 100%

35. 碘酒消毒后，应用酒精脱碘(C)

- A. 1 遍
- B. 2 遍
- C. 3 遍
- D. 4 遍
- E. 5 遍

36. 肥皂水刷手正确的是(B)

- A. 注意甲沟的清洁
- B. 自指尖至肘关节

C. 肘关节为最高位 D. 冲洗时应自上而下至手 E. 反复冲洗 2 遍

37. 使用消毒液时错误的是 (A)

- A. 选择合适的消毒剂 B. 掌握有效浓度、消毒时间及使用方法
- C. 定期更换并定期检查 D. 浸泡前无须洗净擦干、打开轴节
- E. 使用前用无菌生理盐水冲净药液

38. 高压蒸气灭菌法, 当压力达到 104-137.4kPa, 温度达到 121-1260C, 需经多长时间可达到灭菌目的 (D)

- A. 3-10 分钟 B. 10-15 分钟 C. 20-30 分钟
- D. 30-60 分钟 E. 60-90 分钟

39. 正确的刷手范围是 (D)

- A. 从指尖到上臂上 1/3 处 B. 从指尖到上臂中 1/3 处
- C. 从指尖到上臂中、上 1 处 D. 从指尖到上臂中、下 1/3 处
- E. 从指尖到上臂下 1/3 处

40. 无菌术是 (C)

- A. 针对清洁来源采取的措施 B. 应用抗生素预防感染的方法
- C. 防止已灭菌物品被污染的制度 D. 彻底清除手术窗口
- E. 提高病人抵抗防止切口感染

41. 不符合外科感染特点的是 (A)

- A. 多数由单一细菌引起感染 B. 病变以局部炎症为主
- C. 常与创伤有关 D. 常需手术治疗
- E. 可分为特异性和非特异性感染

42. 慢性感染一般指病程在多长时间以内 (E)

- A. 1 周 B. 2 周 C. 3 周 D. 1 个月 E. 2 个月

43. 危险三角区的疖, 首要的护理诊断/合作性问题是 (D)

- A. 潜在并发症: 脓毒症 B. 潜在并发症: 菌血症
- C. 潜在并发症: 毒血症 D. 潜在并发症: 颅内海绵窦静脉炎
- E. 潜在并发症: 休克

44. 皮肤的多个相邻毛囊及其周围组织的急性化脓性感染是 (A)

- A. 疖 B. 疔 C. 丹毒 D. 急性淋巴管炎 E. 急性蜂窝织炎

45. 一般人群预防破伤风最可靠的方法是 (C)
- A. 注人体破伤风免疫球蛋白 B. 注射破伤风抗毒素
C. 注射破伤风类毒素 D. 受伤后注射甲硝唑 E. 受伤后注射青霉素
46. 破伤风注射 TAT 的目的是 (C)
- A. 杀死破伤风杆菌 B. 中和与神经结合的毒素 C. 中和游离的毒素
D. 清除毒素来源 E. 抑制破伤风杆菌生长
47. 为提高脓毒症血培养阳性率, 抽血时间最好选择在 (B)
- A. 发热开始上时 B. 发热最高峰时 C. 寒战结束时
D. 预计发生寒战、发热前 E. 体温正常时
48. 确诊脓肿主要是依靠 (E)
- A. 局部压痛 B. 波动感 C. 白细胞左移
D. 局部红肿 E. 穿刺抽得脓液
49. 破伤风最可靠、最有效的预防方法是 (B)
- A. 破伤风类毒素 B. 破伤风抗毒素 C. 免疫球蛋白
D. 胎盘球蛋白 E. 抗生素
50. 破伤风病人, 最先受累的肌肉是 (D)
- A. 面肌 B. 背腹肌 C. 四肢肌 D. 嚼肌 E. 颈肌
51. 关于外科感染的局部护理, 下列哪项是错误的 (E)
- A. 患肢抬高 B. 关节部位脓肿宜做纵行切口, 以利引流
C. 严禁按摩和挤压 D. 局部制动, 减少活动 E. 热敷, 促进炎症消散
52. 属于闭合性损伤的是 (B)
- A. 切伤 B. 挫伤 C. 刺伤 D. 裂伤 E. 擦伤
53. 损伤已经 12 小时, 清创后仍可一期缝合的部位是 (A)
- A. 面部 B. 背部 C. 足部 D. 上肢 E. 下肢
54. 创伤后最常见的并发症是 (A)
- A. 感染 B. 休克 C. 多系统器官衰竭 D. 应激性溃疡 E. 压疮
55. 伤口清创的最佳时机在伤后 (A)
- A. 6-8 小时内 B. 8-10 小时内 C. 10-12 小时内
D. 12-14 小时内 E. 24 小时内

56. 头面部烧伤，应特别警惕（ D ）
- A. 眼部烧伤 B. 耳部烧伤 C. 鼻部烧伤
D. 呼吸道烧伤 E. 消化道烧伤
57. 烧伤休克期最主要的原因是（ B ）
- A. 创面剧烈疼痛 B. 大量血浆外渗 C. 大量水分蒸发
D. 大量坏死产物吸收 E. 精神刺激
58. 大面积烧伤病人的急救，不妥的是（ C ）
- A. 速置烧伤肢体于凉水中 B. 疑呼吸道烧伤可气管切开
C. 为预防休克给大量饮水 D. 及时用镇静止痛药 E. 清洁布单包裹创面
59. 大面积烧伤急救，病人口渴应给予（ E ）
- A. 糖开水 B. 热开水 C. 凉开水 D. 纯净水 E. 淡盐水
60. 大面积烧伤病人输液中判断血容量已补足的简便、可靠的依据是（ A ）
- A. 尿量 30ml/h 以上 B. 脉搏 120 次/分以下 C. 收缩压 90mmHg 以上
D. 中心静脉压正常 E. 病人安静，肢体温暖
61. 毒蛇咬伤病人的急救护理，正确的是（ B ）
- A. 患肢抬高 B. 患肢宜低垂 C. 患肢宜平置
D. 患肢多活动 E. 患肢多按摩
62. 烧伤休克期调整补液的速度最有效的指标是（ A ）
- A. 尿量 B. 脉搏 C. 血压 D. 末梢循环情况 E. 精神状态
63. 女性病人，32 岁。大面积烧伤并呼吸道烧伤 6 小时，现神志淡漠，面色苍白，皮肤湿冷，P110 次/分，R40 次/分，Bp60/40mmHg(8.0/5.3kpa)，尿量 10ml/h。该病人的护理诊断/合作性问题不包括（ E ）
- A. 皮肤完整性受损 B. 有感染的危险 C. 有窒息的危险
D. 体液不足 E. 潜在并发症：休克
64. 某病人鼻部疖挤压后，出现头痛、高热、昏迷、眼部红肿，首先应考虑的是
- A. 面部蜂窝织炎 B. 菌血症 C. 毒血症
D. 颅内海绵窦静脉炎 E. 脓毒症
65. 男，25 岁，因颈部蜂窝组织炎入院。患者颈部肿胀明显，观察中应特别注意下列哪项（ D ）

- A. 呼吸 B. 体温 C. 神智 D. 血压 E. 吞咽
66. 男, 15 岁, 破伤风患者, 抽搐时引起窒息, 急救处理首先应是 (A)
- A. 口服水合氯醛 B. 肌注鲁米那钠 C. 立即气管切开
D. 静脉滴注 TAT E. 气管插管
67. 下列预防休克的措施中哪项不正确 (E)
- A. 及时引流感染病灶 B. 及时止血 C. 纠正体液失衡
D. 骨折及时固定 E. 用多个热水袋保暖
68. 王护士, 因工作疏忽, 无菌包外未贴消毒指示带, 应怎样处理 (A)
- A. 补贴 B. 放入其他贴有指示带的包中 C. 重新消毒 D. 继续使用 E. 以上都不可
69. 胃肠道手术的术前准备, 下列哪项是错误的 (D)
- A. 手术前 1d 开始进流质饮食 B. 手术前 12h 开始禁食
C. 手术前 4h 开始禁止饮水 D. 手术前 2~3d 开始应用抗生素
E. 术前留置胃管
70. 手术台上器械坠落, 不正确的作法是 (A)
- A. 冲洗后再用 B. 不得使用 C. 应计数
D. 暂不拿出手术间 E. 须核实无误后, 才可关闭胸、腹腔
71. 化学药液灭菌法不适用 (B)
- A. 利器 B. 敷料 C. 内镜 D. 缝线 E. 气有机玻璃
72. 具有灭菌作用的是 (D)
- A. 70%乙醇 B. 0. 1%苯扎溴铵 C. 0. 1%氯己定 (洗必泰)
D. 10%福尔马林 E. 0. 5%碘配
73. 患者, 男性, 60 岁, 因结肠癌拟行手术治疗, 术前血红蛋白 70g/L, 血清白蛋白 25 g/L, 体重较以前下降 5 kg, 入院后应采取的措施是 (C)
- A. 立即手术 B. 给予营养支持, 待体重恢复后手术
C. 给予输血, 肠外营养, 纠正低蛋白血症
D. 全身情况差, 已失去手术时机
E. 先出院, 待全身情况好转再手术
74. 患者, 女性, 精神紧张、烦躁不安、面色苍白、尿量减少、脉压小。应首先给 (C)

A. 血管收缩药 B. 血管扩张药 C. 静脉补液 D. 利尿剂 E. 强心药

75. 患者, 男性, 严重创伤后, 血压降低, 脉搏细速, 面色苍白, 诊断为休克。治疗时重点应注意 (B)

A. 急性肾功能衰竭的发生 B. 及时扩充血容量 C. 及时使用甘露醇
D. 避免使用血管收缩药 E. 药物对各脏器的毒性

76. 患者, 男性, 外伤后出血, 烦躁, 肢端湿冷, 脉搏 105 次/分, 脉压小。应考虑为 (B)

A. 无休克 B. 休克早期 C. 休克中期 D. 休克晚期 E. DIC 形成

77. 低钾血症病人最早出现的临床表现是 (B)

A. 肠麻痹 B. 四肢无力 C. 心动过缓 D. 恶心呕吐 E. 血压下降

78. 脱水病人补充细胞外液最理想的液体是 (C)

A. 生理盐水 B. 5%葡萄糖溶液
C. 乳酸钠林格氏液或碳酸氢钠等渗盐水 D. 右旋糖酐 E. 林格氏液

79. 下列哪项不是观察输液治疗反应的项目 (E)

A. 精神状态 B. 心肺体征 C. 血容量是否恢复
D. 脱水征是否改善 E. 有无皮下出血

80. 治疗休克的关键是 (B)

A. 纠正酸碱失衡 B. 补充血容量 C. 维护重要脏器功能
D. 应用血管活性药物 E. 应用肾上腺皮质激素

二. 多选题

1. 正常人体水分摄入量包括 (ABC)

A. 饮料 B. 固体食物含水 C. 代谢氧化生水 D. 呼吸道蒸发

2. 有关高渗性脱水, 下列说法错误的是 (ACDE)

A. 水分摄入不足 B. 多以失盐为主 C. 水分排出过多
D. 口渴为最早症状 E. 血清钠 $>150 \text{ mmol/L}$

3. 低钾血症常见病因 (ABD)

A. 长期禁食 B. 急性肾衰竭多尿期 C. 大面积烧伤 D. 腹泻

4. 血清钙浓度受下列调节和影响 (BC)

A. 血钾浓度 B. 降钙素 C. 维生素 D D. 低磷血症

5. 低磷血症可有神经肌肉病症，如（ BCD ）
- A. 抽搐 B. 头晕 C. 厌食 D. 肌无力
6. 代谢产酸过量见于（ ABCD ）
- A. 休克 B. 腹膜炎 C. 高热 D. 严重损伤
7. 代谢性酸中毒原因（ AB ）
- A. 腹泻 B. 肠痿 C. 大量输注库血 D. 利尿剂的应用
8. 代谢性碱中毒的原因（ AB ）
- A. 严重呕吐 B. 低钾血症 C. 肠痿 D. 胰痿
9. 呼吸性碱中毒的临床施展阐发（ CD ）
- A. 呼吸浅而慢 B. 偶有精神病症 C. 眩晕 D. 口周麻木及针刺感
10. 水、电解质、酸碱失衡病人护理诊断（ ABCD ）
- A. 心输出量减少 B. 活动无耐力
- C. 低效型呼吸形态 D. 体液不足
11. 支气管扩大病程久者大概有（ CD ）
- A. 心衰 B. 呼衰 C. 贫血 D. 杵状指
12. 膀胱与尿道结石可出现（ ACD ）
- A. 血尿 B. 肾绞痛 C. 尿频、尿急、尿痛 D. 急性尿潴留
13. 水、电解质、酸碱失衡病人保护皮肤和粘膜完整性的护理包括（ ABCD ）
- A. 定时观察 B. 协助翻身 C. 按摩受压部位 D. 口腔护理
14. 纠正酸碱平衡时正确防止并发症（ ABC ）
- A. 使用碳酸氢钠改正酸中毒过量时，可致代谢性碱中毒
- B. 长期吸入高浓度氧纠正呼吸性酸中毒时，可致呼吸性碱中毒
- C. 慢性阻塞性肺部疾患伴历久 CO₂ 滞留，可施展阐发呼吸困难、头痛、头晕甚至昏迷
- D. 改正代谢性酸中毒时，留意补钾可造成高钾血症。
15. 创伤性休克常见于（ BC ）
- A. 外伤所致脾破裂 B. 骨折 C. 挤压综合征 D. 肝破碎
16. 鉴别血尿的正确概念是（ ACD ）
- A. 泌尿系肿瘤为无痛性血尿 B. 泌尿系结石而至血尿伴胸、腹、腰背酸痛

C. 泌尿系熏染而至血尿伴膀胱刺激征 D. 泌尿系结核血尿可伴脓尿

17. 休克时的 ARDS 是指 (AB)

A. 肺泡萎陷 B. 局限肺不张 C. 多系统器官功能衰竭 D. 急性肾衰竭

18. 休克时的胃肠道损伤易并发 (BC)

A. MODF B. 急性胃粘膜糜烂 C. 应激性溃疡 D. ARDS

19. 胸膜腔内活动性出血征象 (BCD)

A. 胸膜腔穿刺抽血不凝固 B. 血红蛋白计数降低 C. 脉搏增快 D. 血压下降

20. CVP 监测值正确表示是 (AD)

A. 正常值 5-12cmH₂O B. 低于 4 cmH₂O 表示血容量不足
C. 高于 12cmH₂O 表示故意功用不全 D. 高于 20cmH₂O 提醒充血性心力弱竭

妇产科护理试题部分

一. 单选题

1. 黄体发育达高峰在排卵后 (A)

A. 7-8 日 B. 9-10 日 C. 11-12 日 D. 13-14 日 E. 15-16 日

2. 正常孕卵植入的部位是 (C)

A. 子宫角部 B. 子宫峡部 C. 子宫体部 D. 子宫下段 E. 子宫颈部

3. 胎盘的组成, 正确的是 (B)

A. 羊膜、平滑绒毛膜、真蜕膜 B. 羊膜、叶状绒毛膜、底蜕膜
C. 羊膜、叶状绒毛膜、真蜕膜 D. 羊膜、平滑绒毛膜、底蜕膜
E. 羊膜、叶状绒毛膜、包蜕膜

4. 关于脐带的描述, 错误的是 (D)

A. 连接胎儿与胎盘 B. 外层为羊膜 C. 长约 50cm
D. 内有一条脐动脉, 两条脐静脉 EV 脐带受压, 可危及胎儿生命

5. 下列可确诊妊娠的是 (A)

A. B 超显示胎心搏动 B. 晨起恶心、呕吐 C. 乳房胀大
D. 停经 E. 自觉胎动

6. 孕妇自我监测胎儿安危最简单有效的方法是 (A)

A. 胎动计数 B. 计算孕龄 C. 测量体重
D. 睡眠情况 E. 情绪波动

7. 侵蚀性葡萄胎一般发生在葡萄胎清宫术后几个月内 (B)
- A. 2 个月 B. 6 个月 C. 8 个月 D. 12 个月 E. 18 个月
8. 外阴局部受伤易形成血肿的部位是 (C)
- A. 阴阜 B. 小阴唇 C. 大阴唇 D. 阴蒂 E. 阴道前庭
9. 有关月经, 下述哪项是错的 (C)
- A. 经期应保持外阴清洁 B. 经血一般不凝
- C. 月经周期为本次月经干净至下次月经来潮
- D. 月经初潮多在 13-15 岁 E. 月经期全身、局部抵抗力均降低
10. 直接维持子宫前倾位置的韧带是 (D)
- A. 主韧带 B. 悬韧带 C. 阔韧带 D. 圆韧带 E. 宫骶韧带
11. 孕卵着床的时间约在受精后 (D)
- A. 第 2-3 天 B. 第 3-4 天 C. 第 5-6 天 D. 第 6-7 天 E. 第 8-9 天
12. 子宫内膜增殖期变化发生在月经周期的 (A)
- A. 5-14 天 B. 15-24 天 C. 1-4 天 D. 25-28 天 E. 10-12 天
13. 胎儿附属物不包括 (B)
- A. 胎盘 B. 子宫肌壁 C. 脐带 D. 羊水 E. 胎膜
14. 维持子宫前倾位的主要韧带是 (C)
- A. 主韧带 B. 宫骶韧带 C. 圆韧带 D. 阔韧带 E. 骶棘韧带
15. 胎盘的形成时间是在妊娠 (E)
- A. 10 周末 B. 18 周末 C. 14 周末 D. 16 周末 E. 12 周末
16. 关于胎盘的防御功能, 正确的是 (B)
- A. 胎盘的屏障作用是非常完善的 B. IgG 可以通过胎盘进入胎儿体内
- C. 药物不能通过胎盘进入胎儿体内 D. 流感、风疹等病毒不能感染胎儿
- E. 母体内的各种抗体均能通过胎盘
17. 胎盘合成的激素哪项除外 (C)
- A. 雌激素 B. 孕激素 C. 黄体生成素
- D. 绒毛膜促性腺激素 E. 胎盘生乳素
18. 关于骨盆的组成正确的是 (A)
- A. 骶骨、尾骨及 2 块髌骨 B. 骶骨、尾骨及坐骨 C. 髌骨、骶骨及坐骨

- D. 髌骨、坐骨及耻骨 E. 髌骨、骶骨及尾骨
19. 正常足月妊娠时, 羊水的量约为 (A)
- A. 800ml B. 500ml C. 1200ml D. 1500ml E. 2000ml
20. 妊娠各周胎儿发育特征, 正确的是 (A)
- A. 妊娠 8 周末, B 超检查显示胎心搏动 B. 妊娠 12 周末, 孕妇可自觉胎动
- C. 妊娠 16 周末, 木质胎心听筒可听到胎心音
- D. 妊娠 20 周末, 生活能力强, 娩出后易存活
- E. 妊娠 24 周末, 指(趾)甲已达指(趾)端
21. 妊娠期母体泌尿系统变化, 错误的是 (D)
- A. 肾小球滤过率增加 B. 输尿管蠕动减弱 C. 部分孕妇可出现尿糖
- D. 增大的子宫压迫膀胱可引起排尿困难 E. 孕妇易患右侧肾盂肾炎
22. 妊娠早期黑加征是指 (D)
- A. 子宫增大变软 B. 子宫呈球形 C. 宫颈充血变软, 呈紫蓝色
- D. 子宫峡部极软, 宫颈和宫体似不相连 E. 在耻骨联合上方可触及宫底
23. 刘女士孕 32 周, 产前检查: 胎背朝向母体腹部右前方, 胎头位于右上腹, 宫底处扪及浮球感胎头, 胎心于脐右上方听得清楚, 其胎方位是 (D)
- A. 枕左前 B. 骶左前 C. 枕右前 D. 骶右前 E. 枕左横
24. 孕妇李女士, 子宫底位于脐与剑突之间, 估计妊娠时间为 (E)
- A. 12 周末 B. 16 周末 C. 24 周末 D. 28 周末 E. 32 周末
25. 张女士, 孕 28 周后行自我胎动计数, 正常的是 (B)
- A. 1-2 次/小时 B. 3-5 次/小时 C. 6-8 次/小时
- D. 10-12 次/小时 E. 4-6 次/小时
26. 胎儿附属物, 不包括 (E)
- A. 胎盘 B. 胎膜 C. 脐带 D. 羊水 E. 子宫肌壁
27. 咨询较可靠的临产先兆是 (B)
- A. 胎膜破裂, 羊水流出 B. 阴道血性分泌物 C. 出现不规则宫缩
- D. 感到腰酸、下坠感 E. 规律且逐渐增强的宫缩
28. 影响分娩的因素不包括 (D)
- A. 产力 B. 产道 C. 胎儿 D. 生命体征 E. 精神心理因素

29. 患者女性, 36 岁, 被诊断为慢性宫颈炎, 患者思想压力较大, 认为自己得了性病, 护士向她正确的解释慢性宫颈炎最常见的病变就是 (A)
- A. 宫颈糜烂 B. 宫颈肥大 C. 宫颈息肉
D. 宫颈腺囊肿 E. 宫颈黏膜炎
30. 患者女性, 48 岁, 体检时发见子宫肌瘤, 非常焦虑, 询问发生子宫肌瘤的原因, 护士回答, 可能的相关因素是 (C)
- A. 早婚、早育 B. 高血压、肥胖 C. 雌激素持续性刺激
D. 不良饮食习惯 E. 性生活紊乱
31. 患者女性, 58 岁, 医生诊断为外阴炎, 护士指导患者正确的是 (E)
- A. 搔抓 B. 热水烫 C. 穿紧身内衣 D. 输液治疗 E. 坐浴
32. 妇科恶性肿瘤死亡率居首位的是 (D)
- A. 外阴癌 B. 宫颈癌 C. 子宫内膜癌 D. 卵巢癌 E. 绒毛膜癌
33. 妇科恶性肿瘤发病率居首位的是 (B)
- A. 外阴癌 B. 宫颈癌 C. 子宫内膜癌 D. 卵巢癌 E. 绒毛膜癌
34. 绒毛膜癌的治疗原则是 (B)
- A. 手术为主, 化疗为辅 B. 化疗为主, 手术为辅
C. 手术为主, 放疗为辅 D. 放疗为主, 手术为辅 E. 放疗为主, 化疗为辅
35. 确诊宫颈癌最可靠的辅助检查方法是 (C)
- A. 宫颈刮片细胞学检查 B. 碘试验 C. 宫颈和宫颈管活体组织检查
D. 阴道镜检查 E. B 超超声

二. 多选题

1. 诊断功能失调性子宫出血的必要条件是 (ABCDE)
- A. 异常子宫出血 B. 外生殖器无器质性病变
C. 内生殖器无器质性病变 D. 全身无器质性病变
E. 调节生殖的神经内分泌机制异常
2. 下列哪项与羊水栓塞的诊断有关 (ABCDE)
- A. 分娩时出现典型的临床表现 B. 抽取下腔静脉血镜检有无羊水成分
C. 胸部 X 平片了解肺部情况 D. ECG 检查 E. 纤溶全套检查
3. 无排卵功血属于 (AC)

- A. 雌激素撤退出血 B. 孕激素撤退出血 C. 雌激素突破出血
D. 孕激素突破出血 E. 雌孕激素撤退出血
4. 关于阴道毛滴虫的描述，正确的有（ ACDE ）
- A. 适宜的生长温度为 25-40℃ B. 滴虫的生活史既有滋养体又有包囊期
C. pH 值为 5.2-6.6 的潮湿环境有利于滴虫生长
D. 它不仅寄生于阴道，还常侵入尿道或尿道旁腺等
E. 它能吞噬或消耗阴道上皮细胞内糖原，阻碍乳酸生成
5. 异位妊娠包括以下几种类型（ ABCDE ）
- A. 腹腔妊娠 B. 卵巢妊娠 C. 宫颈妊娠
D. 输卵管妊娠 E. 阔韧带妊娠
6. 关于子宫脱垂的临床表现是（ ABC ）
- A. I 度患者多数无症状 B. II 度患者有程度不等的腰骶痛
C. III 度患者多伴有重度前壁膨出 D. II 度患者不会有阴道壁膨出
E. 绝经后子宫萎缩，可自然回至盆腔内
7. 与外阴恶性肿瘤有关的病因有（ ABCDE ）
- A. 乳头瘤 B. 尖锐湿疣 C. 人乳头状瘤病毒感染
D. 外阴上皮内非瘤变 E. 巨细胞病毒感染
8. 影响子宫内膜癌的预后因素包括（ ABCDE ）
- A. 病理类型 B. 手术-病理分期 C. 淋巴转移
D. 肌层浸润 E. 治疗方法
9. 妊娠期循环系统的特点有（ ACDE ）
- A. 心脏向左、向上、向前移位 B. 妊娠晚期心率每分钟增加 20-30 次
C. 第二产程心排出量明显增加 D. 在妊娠晚期血压轻度偏高
E. 妊娠期容易出现仰卧位低血压综合征
10. 下列哪些属于卵巢妊娠的诊断标准？（ ABC ）
- A. 双侧输卵管必须正常
B. 囊胚必须位于卵巢上，并以卵巢固有韧带与子宫相连
C. 囊胚壁上有卵巢组织 D. 后穹窿穿刺必须抽到不凝固血液
E. B 超检查宫内未见妊娠物
11. 估计胎儿体重在 3200-3500g 之间，需剖宫产的是（ ACDE ）

- A. 均小骨盆 B. 宫颈水肿 C. 骨盆坐骨结节间径+出口后矢状径=13.5cm
D. 骨盆入口平面绝对性狭窄 E. 中骨盆狭窄
12. 尿瘘术前常规准备包括(ACD)
A. 3-5 日坐浴 B. 口服性激素半月 C. 尿常规检查
D. 抗菌素应用 E. 给予地塞米松
13. 胎产式及胎先露是(ABC)
A. 纵产式一头先露 B. 纵产式一臀先露 C. 横产式一肩先露
D. 枕先露 E. 混合臀先露
14. 常见的孕妇高危因素有(BC)
A. 孕妇体质 B. 孕妇年龄 C. 不良产史
D. 孕妇身高 E. 以上都无关
15. 女型骨盆的特点有(ABD)
A. 入口呈横椭圆形 B. 耻骨弓较宽 C. 坐骨棘间径较窄, 一般<10cm
D. 在我国妇女骨盆类型中占 52%~58.9% E. 骨盆较深

儿科护理试题部分

一. 单选题

1. 唯一能够通过胎盘的抗体为(E)
A. IgA B. IgD C. IgM D. IgE E. IgG
2. 生长速度最快的时期是(B)
A. 幼儿期 B. 婴儿期 C. 学龄前期 D. 学龄期 E. 青春期
3. 1 周岁小儿的体重约为出生体重的(C)
A. 1 倍 B. 2 倍 C. 3 倍 D. 4 倍 E. 5 倍
4. 正常小儿前囟闭合的年龄是(B)
A. 10-12 个月 B. 12-18 个月 C. 18-20 个月 D. 2 岁 E. 2 岁半
5. 下列哪项运动可以预防小儿佝偻病的发生(D)
A. 婴儿抚触 B. 水浴 C. 空气浴 D. 日光浴 E. 游泳
6. 百白破疫苗初种年龄应何时开始(C)
A. 生后 2-3 天 B. 2 个月 C. 3 个月 D. 4 个月 E. 5 个月
7. 新生儿肺透明膜病的主要病因是(D)

- A. 肺间质炎症 B. 肺实质炎症 C. 肺间质纤维化
- D. 缺乏肺表面活性物质 E. 肺表面物质增多所致
8. 大多数新生儿最早出现生理性黄疸的时间是 (B)
- A. 24 小时内 B. 出生后 2-3 天 C. 出生后 4-5 天
- D. 出生后 5-7 天 E. 出生后 7-9 天
9. 鹅口疮的临床表现是 (E)
- A. 口腔黏膜弥漫性充血 B. 溃疡表面有黄白色渗出物
- C. 有发热等全身中毒症状 D. 因疼痛出现拒乳和流涎
- E. 口腔黏膜有乳凝块样物
10. 给鹅口疮患儿清洁口腔应选择的溶液是 (C)
- A. 3%过氧化氢 B. 0.1%雷佛奴尔 C. 2%碳酸氢钠
- D. 0.9%氯化钠 E. 10%氯化钾
11. 儿科病房管理特点以下哪项正确 (E)
- A. 环境管理 B. 预防交叉感染 C. 传染病管理
- D. 预防意外事故 E. 以上均正确
12. 每 100ml 口服补液盐中, 碳酸氢钠(或枸橼酸钠)的含量是 (C)
- A. 0.15g B. 0.2g C. 0.25g D. 0.3g E. 0.35g
13. 新生儿出生后体重下降, 能恢复到出生时体重的时间是 (C)
- A. 2-3 天 B. 4-6 天 C. 7-10 天 D. 11-14 天 E. 15-21 天
14. 新生儿病室适宜的温度是 (C)
- A. 16-18 摄氏度 B. 18-22 摄氏度 C. 22-24 摄氏度
- D. 24-26 摄氏度 E. 26-28 摄氏度
15. 下列哪项是儿科病房特有的设置 (B)
- A. 设有洗澡间、卫生间 B. 病室之间有玻璃隔墙
- C. 设有配餐室、配膳用具 D. 设有床头柜、床旁椅
- E. 设有医、护办公室
16. 婴儿神经系统和呼吸中枢发育不成熟, 选择镇静止惊药时不宜选择 (B)
- A. 安定 B. 吗啡 C. 苯巴比妥 D. 异丙嗪 E. 氯丙嗪
17. 未成熟儿易患佝偻病的最主要原因是 (E)。
- A. 消化酶分泌不足 B. 胃肠道功能不成熟 C. 肝、肾功能发育不成熟

- D. 吸吮力弱, 食物耐受力差 E 生长发育快, 维生素 D 需要量大
18. 婴幼儿腹泻时采取的措施不主张 (C)
- A. 纠正水电解质紊乱 B. 控制肠道感染 C. 使用止泻剂
D. 给予助消化药 E. 给予调整微生态的活菌制剂
19. 小儿给药最常用的方法是 (A)
- A. 口服法 B. 肌肉注射法 C. 静脉注射法 D. 静脉输液法 E. 灌肠法
20. 使用暖箱前应预热暖箱, 首先调节箱温至 (D)
- A. 31℃ B. 32℃ C. 33℃ D. 34℃ E. 35℃
21. 判断脱水性质最有效的辅助检查是 (C)
- A. 测量体重 B. 尿量 C. 血钠浓度 D. 血钾浓度 E. 一氧化碳结合力
22. 臀红护理法应包括下列哪项 (E)
- A. 及时更换尿布或尿裤 B. 大便后温水清洁臀部皮肤
C. 局部涂鞣酸软膏 D. 可采用臀部皮肤暴露法 E. 以上都是
23. 轻度臀红 (表现皮肤潮红), 下列护理哪项不妥 (C)
- A. 勤换尿布, 保持臀部皮肤清洁干燥
B. 排便后, 可用温水洗净吸干涂拭植物油
C. 可用肥皂洗臀及塑料布或油布包裹尿布
D. 室温与气温允许, 可直接暴露臀部于阳光下
E. 可用红外线照射臀部以加速炎症吸收
24. 护理臀红患儿正确的做法是 (E)
- A. 便后应洗净臀部并涂滑石粉 B. 便后应用肥皂清洗臀部
C. 局部有皮疹者可涂激素类软膏 D. 局部表皮剥脱者可涂抗生素软膏
E. 避免用塑料膜或油布包裹尿布
25. 腹泻患儿 “有皮肤完整性受损的危险”, 其下列护理哪项不妥 (A)
- A. 会阴皱褶处不能经常清洗 B. 便后用温水清洗臀部并拭干
C. 选用柔软、清洁的尿布 D. 更换尿布时动作轻柔
E. 避免使用塑料布包裹
26. 新生儿正常的呼吸频率为 (D)
- A. 25-30/min B. 30-35/min C. 35-40/min D. 40-50/min E. 50-60/min
27. 新生儿沐浴的水温应在 (C)

A. 30℃-33℃ B. 33℃-36℃ C. 38℃-40℃ D. 41℃-42℃ E. 42℃-43℃

28. 口服维生素 D 治疗佝偻病, 一般持续多久改为预防量(A)

A. 1 个月 B. 2 个月 C. 3 个月 D. 6 个月 E. 到骨骼体征消失

28. 婴儿手足搐搦症主要死亡原因是(C)

A. 脑水肿 B. 心力衰竭 C. 喉痉挛 D. 呼吸衰竭 E. 手足搐搦

29. 蓝光疗法的适应证为(B)

A. 新生儿硬肿症 B. 新生儿破伤风 C. 新生儿颅内出血

D. 新生儿败血症 E. 新生儿高胆红素血症

30. 使用蓝光箱时, 灯管与患儿皮肤的距离应为(D)

A. 10-15cm B. 15-20cm C. 30-50cm D. 55-60cm E. 60-70cm

31. 中度营养不良的表现是(C)

A. 体重低于正常 8%-10%, 腹壁皮下脂肪厚度 0.8-1cm

B. 体重低于正常 10%-15%, 腹壁皮下脂肪厚度 0.6-0.8cm

C. 体重低于正常 15%-25%, 腹壁皮下脂肪厚度 0.4-0.8cm

D. 体重低于正常 25%-40%, 腹壁皮下脂肪厚度 0.4cm 以下

E. 体重低于正常 40%以上, 腹壁皮下脂肪厚度完全消失

32. 婴儿营养不良最常见的病因是(B)

A. 先天不足 B. 喂养不当 C. 缺乏锻炼 D. 疾病影响 E. 免疫缺陷

33. 营养不良时患儿皮下脂肪减少的顺序为(B)

A. 腹部、面部、躯干、臀部、四肢

B. 腹部、躯干、臀部、四肢、面部

C. 四肢、躯干、臀部、腹部、面部

D. 面部、腹部、躯干、四肢、臀部

E. 躯干、四肢、面部、臀部、腹部

34. 佝偻病患儿早期的临床表现主要是(A)

A. 睡眠不安, 多汗, 枕秃 B. 颅骨软化 C. 方颅 D. 前囟晚闭 E. 出牙延迟

35. 3-4 个月佝偻病患儿可见哪项体征(A)。

A 颅骨软化 B. 方颅 C 肋膈沟 D. 肋串珠 E. O 形腿

二. 多选题

1. 轻型肺炎的临床表现包括(ABCD)

- A. 体温升高 B. 咳嗽、气促 C. 唇周发绀
- D. 两肺中、细湿啰音 E. 心率加快 $>180/\text{min}$
2. 肺炎患儿护理诊断—气体交换受损的具体护理措施以下哪项正确(ABCDE)
- A. 半卧位 B. 及时清理呼吸道, 保持呼吸道通畅
- C. 给氧 D. 按医嘱正确使用抗生素 E. 高枕卧位
3. 肺炎患儿预防心力衰竭的具体护理措施包括(ABCD)
- A. 半卧位 B. 安静休息, 减少刺激 C. 控制输液速度
- D. 密切观察病情 E. 经常翻身, 以利分泌物排出
4. 关于小儿肺炎的护理, 以下哪项正确(ABCE)
- A. 体位采用头高位或半卧位 B. 经常翻身更换体位以减轻肺部淤血
- C. 及时注意吸痰以保持呼吸道畅通
- D. 尽量少喂奶、少喂食, 以防呛咳及引起窒息
- E. 输液时严格控制液量和速度, 以防肺水肿
5. 支气管肺炎患儿宜不采取的体位是(ABCD)
- A. 头侧平卧位 B. 去枕平卧位 C. 左侧卧位
- D. 右侧卧位 E. 头高位或半卧位
6. 下列先天性心脏病中, 哪种不属于无分流型(ABCD)
- A. 房间隔缺损 B. 室间隔缺损 C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症 E. 右位心
7. 先天性心脏病右向左分流型哪项不是最明显的外观特征(ABDE)
- A. 心脏杂音 B. 发育迟缓 C. 持续发绀(青紫)
- D. 心前区隆起 E. 活动耐力下降
8. 法洛四联症患儿喜蹲踞主要因为不包括(ABCD)。
- A. 心脑供血量增加 B. 缓解漏斗部痉挛 C. 腔静脉回心血量增加
- D. 休息、缓解疲劳 E. 增加体循环阻力、减少右向左分流血量
9. 哪项不是病毒性心肌炎常见的病原体是(ACDE)
- A. 风疹病毒 B. 柯萨奇病毒乙组 C. 埃可病毒
- D. 腺病毒 E. 流感病毒
10. 法洛四联症缺氧发作时有效的抢救措施(ABDE)
- A. 膝胸卧位 B. 给氧 C. 静脉注射西地兰

- D. 静脉注射心得安 E. 肌内注射苯巴比妥钠
11. 室间隔缺损伴肺动脉高压时有下列表现, (ACDE)
- A. 左、右心室显著增大 B. 原心脏杂音增强 C. P2 明显亢进
- D. X 线示肺动脉段明显凸出 E. 右心室压力明显增高
12. 动脉导管未闭 X 线检查哪项正确 (ABCD)
- A. 导管细的患者可无异常表现
- B. 分流量大的患者左室、左房增大, 肺动脉段突出
- C. 肺血增多 D. 肺门舞蹈 E. 升主动脉影缩小
13. 法洛四联症杂音描述正确的是 (ACDE)
- A. 胸骨左缘 2-4 肋间 II 一 III 级收缩期喷射音
- B. 病变越重杂音越响 C. P2 减弱
- D 肺动脉瓣区可闻及主动脉单一响亮的第二音 E. 杂音来源于肺动脉狭窄
14. 关于缺铁性贫血的病因下列哪项是正确的 (ABCD)
- A. 储铁不足 B. 铁摄入量不足 C. 生长发育因素
- D. 铁丢失过多或吸收减少 E. 铁利用障碍
15. 属于化脓性脑膜炎颅内压增高的表现是 (ABCD)
- A. 喷射性呕吐 B. 剧烈头痛 C. 血压增高
- D. 前囟饱满 E. 电解质紊乱